

Cyclovena, kapsułki, 60 sztuk

Nasza cena: 27,32 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*60
Postać	kapsułki
Producent	LEK-AM Zakroczym
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

OPIS

Cyclovena to suplement diety w postaci kapsułek zawierający składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych.

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

SKŁADNIKI

suchy wyciąg z ruszczyka kolczastego (*Ruscus aculeatus*) zawierający 22% sumy heterozydów sterolowych, metylochalcon hesperydyny, kwas L-askorbinowy (witamina C), emulgator: glikol polietylenowy 4000, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, woda oczyszczona, barwnik: błękit brylantowy FCF.

Składniki	1 kapsułka	% RWS*
Suchy wyciąg z ruszczyka kolczastego zawierający 22 % sumy heterozydów sterolowych	150 mg	---
Metylochalcon hesperydyny	150 mg	---
Kwas L-askorbinowy	100 mg	125,00%

*%RWS - referencyjna wartość spożycia

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW

Ruszczyk kolczasty:

- wspomaga naturalną lekkość nóg
- wspomaga krążenie żyłne
- wspomaga zachowanie prawidłowej kondycji żył

Witamina C wspomaga prawidłową produkcję kolagenu, a przez to zapewnia prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych.

MASA NETTO

30,6 g (60 kapsułek po 510 mg).

ZAŁECANE DZIENNE SPOŻYCIE

Dorośli: 1 kapsułka rano lub wieczorem.

OSTRZEŻENIA

Nie zaleca się stosowania kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C) w ciemnym i suchym miejscu.

PRODUCENT / DYSTRYBUTOR

LEK-AM Sp. z o.o.

ul. Ostrzykowitzna 14A

05-170 Zakroczym

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.