

Multibiotic, maść 3 g



Nasza cena: 9,42 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	3g
Postać	MASC
Producent	CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY RZESZÓW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	NEOMYCINUM, BACITRACINUM, POLYMYXINUM B

Opis produktu

Opis

Lek Multibiotic ma postać maści i zawiera 3 antybiotyki: neomycynę, polimyksynę B i bacytracynę o działaniu przeciwbakteryjnym.

Dawkowanie - Multibiotic, maść 3 g

Na umytą (mydłem i wodą) i osuszoną skórę nanosi się 2-5 razy na dobę w jednakowych odstępach czasu niewielką ilość maści. W przypadku pominięcia dawki, kolejną zastosować tak szybko, jak to możliwe. Preparat stosować w sposób ciągły przez cały okres leczenia. W razie konieczności stosować z ochronnym gazowym opatrunkiem. Jeśli nie jest to konieczne, nie stosować dłużej niż 7 dni.

Składniki - Multibiotic, maść 3 g

1 g maści zawiera 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas), 10 mg bacytracyny cynkowej (Bacitracinum zincum), 0,833 mg polimyksyny B siarczanu (Polymyxini B sulfas).

Substancje pomocnicze wykazujące działanie biologiczne: propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), wazelina biała

Działania

Bakteriobójczy preparat do stosowania miejscowego zawierający substancje czynne o różnym, wzajemnie uzupełniającym się mechanizmie działania przeciwbakteryjnego.

Neomycyna: hamuje syntezę białek oraz uszkodza błonę cytoplazmatyczną. Mechanizm działania bacytracyny polega na zaburzeniu, hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii.

Polimyksyna B działa bakteriobójczo, a mechanizm działania polega na uszkodzeniu błony cytoplazmatycznej bakterii.

Wskazania - Multibiotic, maść 3 g

- Zapobieganie zakażeniom wtórnym drobnych ran ciętych, zadrapań, otarć i oparzeń.
- Pierwotne i wtórne bakteryjne zakażenia skóry (np. zakażone niewielkie rany, zakażenia bakteryjne skóry w oparzeniach i

odmrożeniach), wywołane przez bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, paciorkowce) oraz Gram-ujemne pałeczki, w tym bakterie z rodzaju Pseudomonas.

Przeciwwskazania - Multibiotic, maść 3 g

Nie należy stosować preparatu:

- w nadwrażliwości na substancje czynne, aminoglikozydy, polimyksyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu,
- u dzieci w wieku do 12 lat, ze względu na ryzyko działania nefrotoksycznego i ototoksycznego,
- na błony śluzowe,
- na głębokie lub klute rany, ciężkie oparzenia,
- na dużą powierzchnię uszkodzonej skóry,
- do oczu,
- na sączące zmiany chorobowe,
- w okresie ciąży i karmienia piersią.

Przeciwwskazania - Multibiotic, maść 3 g

Reakcje uczuleniowe, w tym skórne, z objawami takimi jak świąd, wysypka, zaczerwienienie, opuchlizna. Podrażnienie w miejscu stosowania. Nadkażenie opornymi szczepami bakterii lub drożdżakami Candida.

Ototoksyczność.

Stosowanie na duże powierzchnie uszkodzonej może spowodować uszkodzenie słuchu, łącznie z utratą słuchu, uszkodzenie nerek i wystąpienie objawów neurotoksycznych.

Uwagi

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Specjalne ostrzeżenia i specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania:

Pacjenci uczuleni na jeden lek z grupy aminoglikozydów lub polimyksyn mogą być uczuleni na inne aminoglikozydy lub polimyksyny. W przypadku silnych odczynów alergicznych należy przerwać leczenie.

U pacjentów z osłabioną czynnością nerek, którzy przyjmują działające ogólnie leki nefro- lub ototoksyczne, zastosowanie maści MULTIBIOTIC może nasilać to działanie; stosowanie na duże powierzchnie uszkodzonej skóry może spowodować utratę słuchu.

Jeżeli nie jest to konieczne, nie stosować leku dłużej niż 7 dni.

Ciąża i laktacja:

Brak danych o bezpieczeństwie stosowania preparatu w czasie ciąży i okresie karmienia piersią.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu:

Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Przedawkowanie:

Nie występuje zwykle po zastosowaniu w postaci maści.

Stosowanie długotrwałe na duże powierzchnie uszkodzonej skóry może prowadzić do nefro-, oto- lub neurotoksyczności wskutek wchłonięcia się zawartych w maści antybiotyków.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.