

Inventum Max, 50 mg, 2 tabletki

Nasza cena: 24,99 zł



Opis słownikowy

Dawka	0,05 G
Opakowanie	*4
Postać	TABL.D/ROZGR.I ZUCIA
Producent	AFLOPA - PABIANICE POLSKA
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	SILDENAFILUM

Opis produktu

Opis

Inventum Max, 50 mg, 2 tabletki

Produkt leczniczy Inventum Max wskazany jest do stosowania w leczeniu zaburzeń wzvodu. Lek wyłącznie dla mężczyzn powyżej 18. roku życia. Zaburzenia erekcji definiuje się jako niemożność uzyskania lub utrzymania wzvodu, który wystarcza do odbycia stosunku płciowego.

Skład

1 tabletki zawiera:

Substancja czynna: Syldenafil 50 mg

Substancje pomocnicze: polakrylin potasu, aromat mięty pieprzowej, aspartam, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, powidon K-30, krzemionka koloidalna bezwodna, woda oczyszczona, kroskarmeloza sodowa.

Działanie

Zawarta w leku substancja czynna – sildenafil – to lek z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5(PDE5). Mechanizm jego działania polega na wspomaganiu rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, co wpływa na zwiększenie napływu krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Produkt leczniczy Inventum Max jest skuteczny wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego pobudzenia seksualnego. Lek wskazany dla mężczyzn powyżej 18. roku życia w leczeniu zaburzeń erekcji.

Sposób użycia

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami na ulotce lub według wskazań lekarza. Zalecana dawka leku wynosi 50mg tylko dla mężczyzn, którzy wcześniej stosowali sildenafil w dawce 50mg (lub wyższej) oraz dla mężczyzn, u których lek w dawce 25mg nie przynosił pożądanego efektu (nie uzyskano wzwodu potrzebnego do odbycia stosunku). W przypadku, gdy dawka 25mg jest wystarczająca, nie należy stosować leku w dawce 50mg. Lek stosować nie częściej niż raz na dobę.

Lek należy stosować około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną, tabletkę rozgryźć i żuć do całkowitego rozpuszczenia, tabletki nie trzeba popijać. Do uzyskania pożądanego efektu konieczne jest pobudzenie seksualne. Zwykle działanie jest odczuwane po 30-60 minutach. Lek można stosować z posiłkiem lub niezależnie od jedzenia, przy czym obfity posiłek może opóźnić to działanie. Należy pamiętać, że alkohol może zaburzać zdolność do uzyskania erekcji. Jeśli odczuwane jest wrażenie zbyt słabego lub zbyt mocnego działania, należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli po zastosowaniu leku nie dochodzi do erekcji lub wzwód nie wystarcza do odbycia stosunku, należy skonsultować się z lekarzem.

Ważne informacje

Produkt należy przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła.

Nie należy jednocześnie stosować innych doustnych lub miejscowych terapii zaburzeń wzwodu.

Nie należy jednocześnie stosować z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego z zastosowaniem sildenafilu ani z innymi inhibitorami PDE5.

Nie należy stosować w przypadku, gdy nie występują zaburzenia erekcji.

Produkt leczniczy Inventum Max nie jest przeznaczony dla kobiet.

U osób z zaburzeniami czynności nerek: nie zaleca się stosować sildenafilu w dawce wyższej niż 25mg.

Nie należy stosować poniżej 18. roku życia.

Preparat może wchodzić w interakcję z niektórymi lekami (np. stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej).

Jeśli nastąpi pogorszenie stanu zdrowia, które będzie wymagało pomocy medycznej, należy poinformować o zastosowaniu sildenafilu wraz z godziną zażycia leku. Jeśli po zastosowaniu leku wystąpią działania niepożądane w postaci zaburzeń widzenia i zawrotów głowy, należy wstrzymać się z prowadzeniem pojazdów i obsługą maszyn. Lek zawiera laktozę jednowodną (140,92mg w jednej tabletkce) – w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Lek zawiera aspartam (4,3mg w jednej tabletkce) – jest to źródło fenyloalaniny, dlatego może być szkodliwy w przypadku fenyloketonurii. Lek zawiera potas (13,223mg w jednej tabletkce, mniej niż 1mmol (39mg) w jednej tabletkce) – uznaje się go za „wolny od potasu”. Lek zawiera sód (0,848mg sodu w jednej tabletkce, mniej niż 1mmol (23mg) w jednej tabletkce) – uznaje się go za „wolny od sodu”.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.