

LentoNit K, krople do oczu, 10ml



Nasza cena: 23,78 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Opakowanie | 10 ml |
| Postać | KROP.DO OCZU |
| Producent | Pharm Supply Sp. Z O.o. Polska [PL] |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

Opis

LentoNit K, krople do oczu, 10ml

Wskazania

Krople do oczu Lento Nit K stosuje się w celu nawilżania powierzchni oka, a także w profilaktyce zmętnień soczewki i ciała szklistego oka.

Przeciwwskazania

Lento Nit K nie może być stosowany w przypadku nadczynności tarczycy oraz nadwrażliwości na jod lub jakiegokolwiek inny składnik preparatu. Stosowanie Lento Nit K w czasie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci powinno odbywać się wyłącznie pod kontrolą lekarza.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Ważne informacje

Nie jest znany wpływ Lento Nit K na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Bezpośrednio po zakropleniu oczu może wystąpić krótkotrwałe zaburzenie widzenia.
Nie stosować Lento Nit K, jeżeli butelka jest uszkodzona.

Nie zakraplać Lento Nit K jednocześnie z innymi preparatami podawanymi do oka, ponieważ jednoczesne zakraplanie może zmienić działanie tych preparatów. W przypadku stosowania z innymi preparatami do oczu należy zachować odstęp czasowy ok. 30 minut pomiędzy wkropleniem kolejnych preparatów.

Przed podaniem Lento Nit K należy zdjąć soczewki kontaktowe. Po 15 minutach można je ponownie założyć.

W celu uniknięcia zanieczyszczenia końcówki zakraplacza należy unikać jej kontaktu z powierzchnią oka lub innymi przedmiotami.

Zaleca się dokładnie umyć ręce przed zastosowaniem preparatu. Aby zakropić preparat należy:

- zdjąć zakrętkę
- lekko odchylić głowę do tyłu
- dolną powiekę odciągnąć nieco do dołu i wkropić 1-2 krople preparatu do worka spojówkowego, naciskając na butelkę
- butelkę trzymać otworem do dołu (pionowo)
- te same czynności powtórzyć na drugim oku
- ponownie nałożyć zakrętkę

Interakcje z innymi lekami

Nie zaobserwowano dotychczas interakcji z innymi lekami. Znacząco zwiększone dawki jodku potasu mogą, w połączeniu z diuretykami oszczędzającymi potas (substancje zwiększające wydalanie moczu), prowadzić do hiperkalemii (podwyższony poziom potasu w osoczu). Należy pamiętać, że informacje te dotyczą również innych niedawno przyjmowanych leków.

Dawkowanie

1-2 krople Lento Nit K 3 razy na dobę do worka spojówkowego.

Nieprawidłowe stosowanie

W przypadku przypadkowego, jednorazowego, zastosowania większej niż zalecana dawki produktu Lento Nit K działania niepożądane nie powinny wystąpić.

Działania niepożądane

W przypadku stosowania zgodnego z przeznaczeniem, działania niepożądane nie powinny wystąpić. Jeżeli jednak zaobserwują Państwo u siebie jakiegokolwiek działania niepożądane, należy poinformować o tym swojego lekarza lub farmaceutę i przerwać stosowanie preparatu.

Dane dotyczące trwałości i sposobu przechowywania

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Zawartość butelki może być stosowana nie dłużej niż 4 tygodnie po pierwszym użyciu.

Nie stosować po upływie daty ważności.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.