

Acard 150 mg, 30 tabletek



Nasza cena: 11,88 zł

Opis słownikowy

Dawka	150 MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	POLFA S.A. WARSZAWA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM

Opis produktu

Opis

Acard 150 mg, 30 tabletek

Lek **Acard** przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Dawkowanie:

Zwykle zaleca się następujące dawkowanie: 1 tabletkę (150 mg) na dobę. Tabletki dojelitowe należy przyjmować po posiłku - połykać w całości, popijając niewielką ilością wody. Tabletkę dojelitową ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka. W świeżym zawałe serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca: jednorazowo 2 tabletki dojelitowe (300 mg). Tabletki należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie. **UWAGA:** w ostrym zawałe serca lub podejrzeniu ostrego zawału serca tabletki dojelitowe mogą być stosowane, gdy nie jest dostępny kwas acetylosalicylowy w tabletkach niepowlekanych.

Składniki:

Substancje czynne:
Acidum acetylsalicylicum

Działania:

Lek ACARD zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie płytek krwi.

Wskazania:

Lek stosuje się: w zapobieganiu zawałowi serca u osób o dużego ryzyka, w świeżym zawałe serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca, w niestabilnej chorobie wieńcowej, w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca, po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczępieniu pomostów aortalno-wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych, w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego udaru mózgu oraz po ich przebyciu, u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych, w zapobieganiu zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka, w zapobieganiu

zakrzepicy żyłnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych.

Przeciwwskazania:

Uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek składnik leku, jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi, jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, jeśli pacjent ma poważne problemy z nerkami lub wątrobą, lub sercem, jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości napady astmy po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych (objawy: duszności, świszczący oddech), jeśli pacjentka jest w III trymestrze ciąży, jeśli pacjent stosuje metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, u dzieci do 12 lat z infekcjami wirusowymi, z uwagi na możliwość uszkodzenia wątroby i mózgu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.