

Acc 200 Max, tabletki musujące, 200 mg, 25 szt (import równoległy)



Nasza cena: 18,95 zł

Opis słownikowy

Dawka	200MG
Opakowanie	*25
Postać	TABL.MUS.
Producent	INPHARM SP. Z O. O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ACETYLCYSTEINUM

Opis produktu

Opis

Dawkowanie - Acc 200 Max, tabletki musujące, 200 mg, 25 szt (import równoległy)

Lek należy przyjmować po posiłku. Podczas leczenia należy wypijać odpowiednio dużą ilość płynów (co najmniej 1,5 l. dziennie).

Dorośli i dzieci powyżej 14 roku życia: 1 tabletkę musującą dwa lub trzy razy dziennie,

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat: 1 tabletkę musującą dwa razy na dobę.

Tabletkę rozpuścić w szklance wody i wypić natychmiast po rozpuszczeniu.

Składniki - Acc 200 Max, tabletki musujące, 200 mg, 25 szt (import równoległy)

1 tabletkę musującą zawiera 200mg acetylocysteiny;

Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu, sacharyna sodowa, kwas askorbowy, aromat jeżynowy, węglan sodu, cyklaminian sodu, makrogol 8000, aromat z owoców leśnych.

Działania

Tabletki musujące ACC MAX zawierają substancję czynną acetylocysteinę - lek, który przede zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.

Wskazania - Acc 200 Max, tabletki musujące, 200 mg, 25 szt (import równoległy)

ACC MAX zalecany jest jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem.

Przeciwwskazania - Acc 200 Max, tabletki musujące, 200 mg, 25 szt (import równoległy)

Nie zaleca się stosowania leku u osób:

- z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników leku,
- z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy,
- z ostrym stanem astmatycznym (zaostrzeniem astmy oskrzelowej lub przewlekłą obturacyjnej choroby płuc),
- ze zmniejszoną zdolnością do odkrztuszania wydzieliny,
- u kobiet w ciąży lub karmiących piersią,
- u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przeciwwskazania - Acc 200 Max, tabletki musujące, 200 mg, 25 szt (import równoległy)

- niezbyt często: zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, ból głowy, szumy uszne,
- rzadko: zgaga, nudności, wymioty, biegunka, reakcje alergiczne ze świądem, pokrzywką, wysypką, skurczem oszreli, przyśpieszonym biciem serca oraz obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi.
- bardzo rzadko: niedokrwistość, krwotok, krwiak osierdzia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.