

Acc 200, tabletki, 20 szt.



Nasza cena: 14,01 zł

Opis słownikowy

Dawka	200MG
Opakowanie	*20
Postać	Tabletki
Producent	Salutas Pharma
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Preparat rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszenie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem.

Dawkowanie - Acc 200, tabletki, 20 szt.

Lek należy przyjmować po posiłku. Tabletkę należy rozpuścić w 1/2 szklanki wody i wypić natychmiast po rozpuszczeniu. Podczas leczenia należy wypijać odpowiednio dużą ilość płynów (co najmniej 1.5 litra dziennie). Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat: 1 tabletkę musująca 2 lub 3 razy na dobę. Dzieci w wieku 6 - 14 lat: 1 tabletkę musująca 2 razy na dobę.

Składniki - Acc 200, tabletki, 20 szt.

1 tabletkę musująca zawiera 200 mg acetylocysteiny oraz substancje pomocnicze: kwas cytrynowy bezwodny, wodorowęglan sodu, węglan bezwodny, kwas askorbowy, sacharyna sodowa, sodu cyklamianian, makrogol 8000, aromat jeżynowy, aromat jagodowy.

Działania

ACC Max zawierają substancję czynną acetylocysteinę - lek, który przede wszystkim zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej, pobudza jej wydzielanie i ułatwia odkrztuszenie.

Przeciwwskazania - Acc 200, tabletki, 20 szt.

Nie należy stosować u następujących osób:

- uczulonych na składniki preparatu,
- z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy,
- z ostrym stanem astmatycznym,
- ze zmniejszoną skłonnością do odkrztuszania wydzieliny,
- u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią,
- u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przeciwwskazania - Acc 200, tabletki, 20 szt.

niezbyt często: zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, ból głowy, szумы uszne,
rzadko: zgaga, nudności, wymioty, biegunka, reakcje alergiczne ze świądem, pokrzywką, wysypką, skurczem oszreli, przyśpieszonym biciem serca oraz obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi.
bardzo rzadko: niedokrwistość, krwotok, krwiak osierdzia.

Uwagi

Bez zalecenia lekarza nie należy stosować leku ACC Max dłużej niż 4 do 5 dni.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.