

Acenol, 300mg, 20 tabletek

Nasza cena: 4,75 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------|-----------------|
| Dawka | 300MG |
| Opakowanie | *20 |
| Postać | Tabletki |
| Producent | Galena Wrocław |
| Rejestracja | Lek bez recepty |

Opis produktu

Opis

Acenol zawiera paracetamol, stosowany w bólach różnego pochodzenia (ból głowy, zębów, stawowe, miesiączkowe, nerwobóle i inne).

Dawkowanie - Acenol, 300mg, 20 tabletek

Lek podaje się drogą doustną

Dzieci od 6 do 12 roku życia: doustnie 1/2 do 1 tabletki trzu lub cztery razy na dobę w odstępach nie krótszych niż 6 godzin,

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: doustnie jedną do trzech tabletek trzy lub cztery razy na dobę w odstępach nie krótszych niż 4 godziny, maksymalnie trzynaście (13) tabletek na dobę.

Składniki - Acenol, 300mg, 20 tabletek

1 tabletkę zawiera substancję czynną paracetamol 300 mg oraz substancje pomocnicze: powidon, skrobia żelowana, kwas stearynowy, kroscarmeloza sodowa.

Działania

Może być jednym z leków w zwalczaniu bólu. Działa przeciwgorączkowo.

Przeciwwskazania - Acenol, 300mg, 20 tabletek

Nie należy stosować leku:

- jeśli występowała lub występuje nadwrażliwość na paracetamol lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku
- w chorobie alkoholowej,
- w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek

Jak każdy lek Acenol może powodować objawy niepożądane. W czasie leczenia mogą wystąpić niżej wymienione objawy niepożądane. Objawy niepożądane pogrupowano następująco, w zależności od częstości występowania:

bardzo często : częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów,
często: rzadziej niż u 1 na 10 ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów,
niezbyt często: rzadziej niż u 1 na 100 ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów,
rzadko: rzadziej niż u 1 na 1000 ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów,
bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach,
nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Uwagi

Podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu. Alkohol nasila toksyczne działanie paracetamolu.
Obecność pożywienia w żołądku zmniejsza wchłanianie paracetamolu, stąd zażywanie leku po jedzeniu zmniejsza jego skuteczność.
Cięża i karmienie piersią: przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Przechowywać w miejscach niedostępnych i niewidocznych dla dzieci.

O tym co powoduje ból głowy i jakie są jego przyczyny dowiedzą się Państwo z artykułu "O czym świadczy ból głowy?"

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.