

Acesan 30 mg, 63 tabletki



Nasza cena: 13,68 zł

Opis słownikowy

Dawka	30MG
Opakowanie	*63
Postać	Tabletki
Producent	SUN-FARM POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM

Opis produktu

Opis

Acesan 30 mg, 63 tabletki

Acesan to preparat polecany m.in w profilaktyce zawału serca, udaru mózgu, powikłaniom zatorowo- zakrzepowych.

Wskazania - Acesan tabletki 30mg x 63 do stosowania preparatu Acesan:

- zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka
- zapobieganie powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po interwencjach na naczyniach
- zapobieganie udarowi mózgu
- w dławicy piersiowej
- zapobieganie powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po świeżym zawale mięśnia sercowego.

Działanie:

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy hamujący zdolność płytek krwi do agregacji i tworzenia zakrzepów. Kwas acetylosalicylowy należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Jego działanie polega na hamowaniu aktywności enzymu cyklooksygenazy (COX-1), niezbędnego do syntezy tromboksanu A2 (TXA2) - głównego czynnika powodującego zlepianie się płytek krwi.

Dawkowanie - Acesan tabletki 30mg x 63:

Tabletki należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, tabletki należy przyjmować doustnie, najlepiej przed posiłkami, z dużą ilością płynu.

Przeciwwskazania - Acesan tabletki 30mg x 63

Nie stosować leku Acesan:

- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek składnik leku,
- u pacjentów ze skazą krwotoczną, u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy,
- u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, nerek lub serca,
- u pacjentów z napadami astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych,
- w ostatnim trymestrze ciąży,
- u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.