

# Acesan tabletki 75mg x 63



Nasza cena: 6,85 zł

## Opis słownikowy

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Dawka       | 75MG            |
| Opakowanie  | *63             |
| Postać      | Tabletki        |
| Producent   | Sun-Farm        |
| Rejestracja | Lek bez recepty |

## Opis produktu

### Opis

Acesan to preparat polecany m.in w profilaktyce zawału serca, udaru mózgu, powikłaniom zatorowo- zakrzepowych.

### **Wskazania - Acesan tabletki 75mg x 63 do stosowania preparatu Acesan:**

- zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka
- zapobieganie powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po interwencjach na naczyniach
- zapobieganie udarowi mózgu
- w dławicy piersiowej
- zapobieganie powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po świeżym zawale mięśnia sercowego.

### **Działanie:**

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy hamujący zdolność płytek krwi do agregacji i tworzenia zakrzepów. Kwas acetylosalicylowy należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Jego działanie polega na hamowaniu aktywności enzymu cyklooksygenazy (COX-1), niezbędnego do syntezy tromboksanu A2 (TXA2) - głównego czynnika powodującego zlepianie się płytek krwi.

### **Dawkowanie - Acesan tabletki 75mg x 63:**

Tabletki należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, tabletki należy przyjmować doustnie, najlepiej przed posiłkami, z dużą ilością płynu.

Przeciwwskazania - Acesan tabletki 75mg x 63

### **Nie stosować leku Acesan:**

- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakiegokolwiek składnik leku,
- u pacjentów ze skazą krwotoczną, u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy,
- u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, nerek lub serca,

- u pacjentów z napadami astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych,
- w ostatnim trymestrze ciąży,
- u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**