

Acidolit smak malinowy, 10 saszetek

Nasza cena: 22,52 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	Saszetki
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Typ Produktu	Suplement diety

Opis produktu

Opis

Acidolit smak malinowy, 10 saszetek

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w stanach odwodnienia organizmu.

Dawkowanie - Acidolit smak malinowy, 10 saszetek

Do 200 ml przegotowanej, chłodnej wody dodać zawartość 1 saszetki i wymieszać. Niemowlętom i małym dzieciom płyn można podawać w butelce ze smoczką. Rioztwóru nie należy dosładzać. Jeśli występują wymioty płyn podawać schłodzony, małymi porcjami w niewielkich odstępach czasu (np. co 5 minut).

Waga dziecka	Nawadnianie (pierwsze 3-4 godziny nawadniania)	Nawadnianie podtrzymujące
Do 4 kg	200-400 ml (1-2 saszetki)	50 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach
4-8 kg	400 ml-800 ml (2-4 saszetki)	100-150 ml po każdym biegunkowym

		stolcu lub wymiotach
8-12 kg	800 ml-1200 ml (4-6 saszetek)	100-150 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach
Powyżej 12 kg	>1200 ml (6 saszetek)	100-200 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach

Składniki - Acidolit smak malinowy, 10 saszetek

Glukoza bezwodna, cytrynian sodu dwuwodny, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat naturalny. Preparat nie zawiera białka mleka, laktozy i glutenu.

Działania

Zawarty w saszetce proszek po rozmieszaniu w wodzie tworzy doustny płyn nawadniający o zmniejszonej osmolarności i obniżonej zawartości sodu, zgodny z najnowszymi zaleceniami ESPGHAN.

Wskazania - Acidolit smak malinowy, 10 saszetek

Acidolit saszetki stosuje się w stanach zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej w sytuacjach, w których istnieje ryzyko odwodnienia w celu nawadniania oraz uzupełniania składników mineralnych w organizmie zarówno podczas biegunki, jak i biegunki połączonej z wymiotami.

Przeciwwskazania - Acidolit smak malinowy, 10 saszetek

Wstrząs hemodynamiczny, niedrożność jelit.

Uwagi

Stosować pod nadzorem lekarza.

Produkt może być stosowany u niemowląt, dzieci a także osób dorosłych. Acidolit w wersji bezsmakowej zaleca się stosować u niemowląt poniżej 6 roku życia oraz dzieci ze skłonnościami do alergii.