

Acidum Folicum Hasco 15 mg 30 tabletek

Nasza cena: 9,07 zł

Opis słownikowy

Dawka	15MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	ACIDUM FOLICUM

Opis produktu

Opis

Acidum Folicum Hasco 5 mg, 30 tabletek

Wskazania

Lek ten powinien być stosowany przez pacjentów:

- profilaktycznie i leczniczo w stanach jego niedoboru,
- w niedokrwistości megaloblastycznej,
- w zaburzeniach wchłaniania jelitowego,
- w niedożywieniu,
- w alkoholizmie,
- w łuszczycy,
- u pacjentów przyjmujących leki przeciwdrgawkowe lub doustne środki antykoncepcyjne,
- u pacjentów przyjmujących leki przeciwbakteryjne,
- w chorobach związanych z przewlekłą hemolizą,
- we wtórnej profilaktyce wrodzonych wad cewy nerwowej,
- u kobiet ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wad cewy nerwowej u ich potomstwa, przez miesiąc przed planowaną ciążą i I trymestr ciąży.

Dawkowanie

Produkt powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego i według jego ścisłych zaleceń.

Kwas foliowy stosuje się:

- w niedokrwistości megaloblastycznej (zawsze w skojarzeniu z wit. B12): 5 mg/dobę przez 4 m-ce;

- w stanach złego wchłaniania: 15 mg/dobę;
- w przewlekłych stanach hemolitycznych (talasemia, niedokrwistość sierpowata), u pacjentów poddawanych hemodializie: 5 mg co 1 do 7 dni, przez miesiąc;
- w ciąży i okresie poprzedzającym zajście w ciążę u kobiet ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wad cewy nerwowej u ich potomstwa: 5 mg/dobę przez miesiąc przed planowanym zajściem w ciążę, kontynuując podawanie podczas I trymestru ciąży.

Działanie

- uzupełnia niedobory kwasu foliowego,
- wpływa na stan tkanek płodowych, nabłonek przewodu pokarmowego i układ krwiotwórczy,
- zmniejsza ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej.

Skład

1 tabletkę zawiera 15 mg kwasu foliowego.

Przeciwwskazania

Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów u których została stwierdzona nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Możliwe działania niepożądane

Zazwyczaj podczas stosowania kwasu foliowego nie występują działania niepożądane. Jeżeli już wystąpią jakieś działania niepożądane przejawiają się one poprzez zaburzenia żołądkowo-jelitowe, reakcje alergiczne (wysypka, zaczerwienienia, swędzenie). Jeżeli u pacjenta pojawią się którekolwiek z działań niepożądanych powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.