

Acodin, syrop, 100ml



Nasza cena: 15,08 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,3G
OGRANICZENIE ILOŚCI	KODEINA, PSEUDOEFEDRYNA, DEXTROM
Opakowanie	100 ml (but.szklana)
Postać	SYROP
Producent	Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	DEXTROMETHORPHANUM, ACIDUM PANTHOTENICUM

Opis produktu

Opis

Acodin, syrop, 100ml

Lek Acodin 300 występuje w postaci syropu i zawiera substancje czynne dekstrometofanu bromowoderek i dekspantenol.

Dawkowanie - Acodin, syrop, 100ml

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
5 ml syropu Acodin 300 do 4 razy na dobę.

Składniki - Acodin, syrop, 100ml

5 ml syropu zawiera substancje czynne: dekstrometofanu bromowoderek 15 mg i dekspantenol 50 mg.
Substancje pomocnicze: karboksymetylocelulozy sól sodowa, gliceryna, sacharoza, benzoesan sodu, karmel spożywczy, kwas cytrynowy, esencja malinowa spożywcza, woda oczyszczona.

Działania

Dekstrometofan wykazuje działanie przecikaszlowe, hamuje odruch kaszlowy przez bezpośrednie działanie na ośrodkowy układ nerwowy. W stosowanych dawkach nie wpływa hamująco na działanie aparatu rzęskowego oskrzeli (struktura odpowiedzialna za transport wydzielonego śluzu). Dekspantenol odgrywa rolę w procesie regeneracji błon śluzowych dróg oddechowych.

Wskazania - Acodin, syrop, 100ml

Preparat stosowany w leczeniu objawowym suchego kaszlu różnego pochodzenia (nie związanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych).

Przeciwwskazania - Acodin, syrop, 100ml

Nie należy stosować leku Acodin 300 w przypadku:

- nadwrażliwości na dekstrometorfan lub którykolwiek składnik leku,
- jednoczesnego stosowania leków z grupy inhibitorów monoaminoooksydazy MAO; należy również zachować 14 dniową przerwę między zaprzestaniem podawania inhibitorów MAO, a rozpoczęciem stosowania dekstrometorfanu,
- niewydolności oddechowej lub ryzyka jej wystąpienia,
- astmy oskrzelowej.

Przeciwwskazania - Acodin, syrop, 100ml

W trakcie stosowania leku Acodin 300 działania niepożądane występują rzadko.
Mogą wystąpić: senność, zawroty głowy i zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, w tym nudności, wymioty.

Uwagi

Ciąża: przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Karmienie piersią: Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią.

Lek Acodin nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.