

Acti-Trin, syrop, 100 ml



Nasza cena: 22,01 zł

Opis słownikowy

OGRANICZENIE ILOŚCI	KODEINA, PSEUDOEFEDRYNA, DEXTROM
Opakowanie	100 ml
Postać	SYROP
Producent	HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	TRIPROLIDINUM, PSEUDOEPHEDRINUM, DEXTROM

Opis produktu

Opis

Lek Actitrin stosuje się w leczeniu objawowym w stanach zapalnym górnych dróg oddechowych (grypa, przeziębienie i inne infekcje górnych dróg oddechowych) przebiegających z kaszlem, obrzękiem błony śluzowej nosa i wodnistym wysiękiem z nosa.

Dawkowanie - Acti-Trin, syrop, 100 ml

- dzieci od 7 do 12 lat: 5 ml syropu 3 do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 6 godzin.
- dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 10 ml syropu 3 do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 6 godzin.

Składniki - Acti-Trin, syrop, 100 ml

5 ml syropu zawiera:

substancje czynne:

- chlorowodorek triprolidyny 1,25 mg, chlorowodorek pseudoefedryny 30 mg, bromowodorek dekstrometorfanu 10 mg.

substancje pomocnicze:

- maltitol ciekły, sodu benzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, sacharyna sodowa, lewomentol, wanilina, aromat "cola" (substancje aromatyczne naturalne, triacetyna E1518, etanol), barwniki (żółcień chinolinowa, czerwień koszenilowa, czerń brylantowa), etanol 96% (v/v), woda oczyszczona.

Działania

Lek Actitrin zawiera trzy substancje czynne: triprolidynę, pseudoefedrynę i dekstrometorfan. Triprolidyna w skojarzeniu z pseudoefedryną hamuje odruch kichania, zmniejsza ilość wydzieliny z nosa i inne objawy przeziębienia. Pseudoefedryna ponadto zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa przez co zwiększa jego drożność. Dekstrometorfan działa przeciwkaszlowo.

Przeciwwskazania - Acti-Trin, syrop, 100 ml

Nie należy stosować leku Actitrin, jeśli występuje:

- nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku,
- podczas leczenia inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) (takimi jak iproniazyd, fenelzyna, izokarboksyd, tranilcypromina, klogilina, selegilina, toloksaton, amiflamina, moklobemid, lazabemid) oraz przez 2 tygodnie po odstawieniu inhibitorów MAO, w astmie oskrzelowej,
- ciężkiej niewydolności wątroby i nerek,
- w niewydolności oddechowej,
- w kaszlu z dużą ilością wydzieliny oraz kaszlu związanym z astmą oskrzelową,
- w ciężkim nadciśnieniu,
- ciężkiej chorobie niedokrwiennej serca,
- w mukowiscydozie,
- u kobiet w ciąży i karmiących piersią,
- u dzieci do 7 lat

Przeciwwskazania - Acti-Trin, syrop, 100 ml

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

spadek nastroju, zmęczenie, pobudzenie, zawroty głowy, zaburzenia snu, senność, niepokój, halucynacje, zaburzenia rytmu serca (tachycardia), nudności, wymioty, zaparcia lub biegunki, suchość błony śluzowej jamy ustnej i nosogardzieli, zatrzymanie moczu i bolesne oddawanie oczu (zwłaszcza u mężczyzn z objawami przerostu gruczołu krokowego), wysypka ze świądem lub bez świądu, pokrzywka.

Uwagi

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25 oC. Chronić od światła.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.