

Actifed, syrop, 100 ml



Nasza cena: 24,49 zł

Opis słownikowy

OGRANICZENIE ILOŚCI	KODEINA, PSEUDOEFEDRYNA, DEXTROM
Opakowanie	100 ml
Postać	SYROP
Producent	MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON & JOHN WIELKA BRYTANIA [GB]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	TRIPROLIDINUM, PSEUDOEPHEDRINUM, DEXTROM

Opis produktu

Opis

Actifed, syrop, 100 ml

Lek Actifed ma postać przezroczystego syropu o czerwonej barwie i smaku jeżynowym.

Dawkowanie

Dawkowanie - Actifed, syrop, 100 ml u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat 10 ml syropu trzy lub cztery razy na dobę. Dawkowanie u dzieci w wieku 7 - 12 lat 5 ml syropu trzy lub cztery razy na dobę.

Skład

- Tripolidini hydrochloridum 1,25 mg
- Pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg
- Dekstrometorphanii hydrobromidum 10 mg

Działanie

Preparat Actifed zawiera triprolidynę, pseudoefedrynę i dekstrometorfan. W wyniku działania trzech składników preparat łagodzi objawy przeziębienia takie jak kaszel i katar. Triprolidyna należy do grupy pochodnych piroolidyny i jest silnym antagonistą receptora histaminowego typu H1, działającym konkurencyjnie. Triprolidyna nieznacznie działa hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, co może powodować wystąpienie objawów senności. W nieżytych dróg oddechowych powoduje zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa, wycieku z nosa, świądu i kichania. Pseudoefedryna jest lekiem sympatykomimetycznym, wywierającym bezpośredni i pośredni wpływ na układ współczulny. Jest środkiem zmniejszającym przekrwienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych. W porównaniu z efedryną, pseudoefedryna w znacznie mniejszym stopniu wywołuje tachykardię i zwiększa skurczowe ciśnienie krwi oraz słabiej

pobudza ośrodkowy układ nerwowy. Dekstrometorfan jest pochodną opioidową, działa przeciwkaszlowo hamując działanie ośrodka kaszlowego w rdzeniu przedłużonym.

Wskazania

Leczenie objawowe w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych przebiegających z obrzękiem błony śluzowej (blokadą) nosa i wysiękiem z nosa oraz kaszlem u dorosłych i dzieci w wieku od 7 lat.

Przeciwwskazania

Syropu Actifed nie należy stosować w następujących przypadkach: -u dzieci w 1 roku życia; -u osób z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników leku; -w przypadku kaszlu związanego z astmą oskrzelową lub kaszlu z dużą ilością wydzieliny; -u osób z niewydolnością oddechową lub zagrożonych jej wystąpieniem; -u osób z ciężkim nadciśnieniem lub z dławicą piersiową niestabilną; -u osób leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) oraz przez 2 tygodnie po odstawieniu inhibitorów MAO. -u osób z mukowiscydozą.

Możliwe działania nieporządane

Mogą wystąpić objawy pobudzenia lub hamowania ośrodkowego układu nerwowego, najczęściej zgłaszano senność. Opisywano również zaburzenia snu i rzadko omamy.

Sporadycznie mogą wystąpić: wysypka skórna, z podrażnieniem lub bez podrażnienia, przyspieszenie czynności serca, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nosa i gardła. Sporadycznie opisywano także zatrzymanie moczu u mężczyzn.

Dekstrometorfan sporadycznie może powodować nudności, wymioty i zaburzenia żołądka i jelit.

Uwagi

Podczas stosowania leku Actifed nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.