

# Actifolin 0,8mg, 30 tabletek powlekanych

Nasza cena: 17,46 zł



## Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	POLSKI LEK POLSKA
Rejestracja	Suplement diety

## Opis produktu

### OPIS

ActiFolin - suplement diety zawierający w swoim składzie kwas foliowy, w tym foliany. Preparat przeznaczony dla kobiet planujących ciążę i kobiet w ciąży.

### SKŁADNIKI

#### Składniki

substancje wypełniające: celuloza, sorbitole; substancja zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza; substancje przeciwzbrylające: poliwinylpirolidon, glikol polietylenowy; sól glukozaminowa kwasu (6S)-5-metylotetrahydrofoliowego; kwas pteroilomonoglutaminowy; substancja wypełniająca: talk; trójglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha; barwnik: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza, ryboflawiny.

Składniki	1 tabletki	% RWS*
Kwas foliowy, w	800 µg	400%
tym:	400 µg	200%
aktywna forma folianu	400 µg	200%
kwas foliowy		

\*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

### WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW

Foliany to substancje należące do witamin z grupy B. Wspomagają one prawidłową produkcję krwi.

### ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE

Dorośli: 1 tabletki dziennie.

Tabletkę należy połknąć i popić wodą.

### PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

**OSTRZEŻENIA**

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.  
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.  
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.

**MASA NETTO**

7,5 g

**PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w temperaturze pokojowej.  
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

**PRODUCENT**

POLSKI LEK  
Chopina 10  
Wadowice

**INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.  
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.  
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.  
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  
Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.  
Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.