

## Aescin tabletki, 30 sztuk (import równoległy)



Nasza cena: 15,50 zł

### Opis słownikowy

Dawka	0,02 G
Opakowanie	*30
Postać	TABL.DOJELIT.
Producent	DELFARMA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ESCINUM

### Opis produktu

#### Opis

### Aescin tabletki, 30 sztuk (import równoległy)

Aescin to preparat uszczelniający śródbłonek naczyń krwionośnych stosowany m.in w schorzeniach kończyn dolnych.

Aescin powoduje szybsze wchłanianie krwiaków pourazowych oraz zmniejsza prawdopodobieństwo ich wystąpienia w okresie pooperacyjnym (szczególnie po zabiegach chirurgicznych narządu ruchu). Ponadto, uszczelniając śródbłonek naczyń krwionośnych poprawia krążenie żylnolimfatyczne. Lek stosowany jest również w zapobieganiu zakrzepowemu zapaleniu żył w okresie pooperacyjnym, także w leczeniu zaburzeń krążenia żylnego kończyn i żylaków kończyn dolnych.

#### Wskazania:

- Leczenie przewlekłej niewydolności żylniej, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu
- Leczenie zapalenia żył kończyn dolnych
- Profilaktyka i leczenie krwiaków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych

#### Działania niepożądane:

Jak każdy lek, Aescin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

- Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 100): zaburzenia czynności przewodu pokarmowego
- Bardzo rzadko (mniej niż u 1 na 10000 pacjentów): reakcjenadwrażliwości, w tym pokrzywka.

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

#### Nie stosować leku Aescin:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Aescin.
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek
- u kobiet w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Dawkowanie:

Lek **Aescin** tabletki powlekane przeznaczony jest do stosowania doustnego.

**Dorośli:** zazwyczaj stosowana dawka leku Aescin to 3 razy na dobę po 2 tabletki, po posiłku, popijając dużą ilością płynu.

**Profilaktycznie** można stosować na minimum 16 godzin przed zabiegiem chirurgicznym. Po 2-3 miesiącach leczenia można zastosować leczenie podtrzymujące w dawce 40 mg (2 tabletki) 2 razy na dobę. W przypadku stosowania środków antykoncepcyjnych można przyjmować podwójną dawkę alfa-escyny.

**Osoby w podeszłym wieku:** nie jest konieczna zmiana dawkowania.

**Dzieci:** nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**