

# Aescin tabletki dojelitowe 0,02g x 30 (import równoległy)



Nasza cena: 17,77 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,02 G
Opakowanie	*30
Postać	TABL.DOJELIT.
Producent	INPHARM SP. Z O. O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ESCINUM

## Opis produktu

### Opis

Preparat uszczelniający śródbłonek naczyń krwionośnych stosowany m.in w schorzeniach kończyn dolnych.

### Dawkowanie - Aescin tabletki dojelitowe 0,02g x 30 (import równoległy):

Lek Aescin tabletki powlekane przeznaczony jest do stosowania doustnego.

### Dorośli:

Zazwyczaj stosowana dawka leku Aescin to 3 razy na dobę po 2 tabletki, po posiłku, popijając dużą ilością płynu. Profilaktycznie można stosować na minimum 16 godzin przed zabiegiem chirurgicznym. Po 2-3 miesiącach leczenia można zastosować leczenie podtrzymujące w dawce 40 mg (2 tabletki) 2 razy na dobę. W przypadku stosowania środków antykoncepcyjnych można przyjmować podwójną dawkę alfa-escyny.

### Osoby w podeszłym wieku:

Nie jest konieczna zmiana dawkowania.

### Dzieci:

nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

### Składniki - Aescin tabletki dojelitowe 0,02g x 30 (import równoległy):

Substancją czynną leku jest alfa-escyna  
Inne składniki: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, talk, magnezu stearynian.

Otoczka: talk, tytanu dwutlenek, powidon, polisorbat 80, kopolimer kwasu metakrylowego, sodu karboksymetyloceluloza, żółcień pomarańczowa, silikonowa emulsja przeciwwapienna.

## Działania:

Aescin powoduje szybsze wchłanianie krwiaków pourazowych oraz zmniejsza prawdopodobieństwo ich wystąpienia w okresie pooperacyjnym (szczególnie po zabiegach chirurgicznych narządu ruchu). Ponadto, uszczelniając śródbłonek naczyń krwionośnych poprawia krążenie żylnolimfatyczne. Lek stosowany jest również w zapobieganiu zakrzepowemu zapaleniu żył w okresie pooperacyjnym, także w leczeniu zaburzeń krążenia żylnego kończyn i żylaków kończyn dolnych.

## Wskazania - Aescin tabletki dojelitowe 0,02g x 30 (import równoległy):

Preparat stosowany w leczeniu przewlekłej niewydolności żylniej, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu, zapaleniu żył kończyn dolnych oraz w profilaktyce i leczeniu krwiaków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych.

## Przeciwwskazania - Aescin tabletki dojelitowe 0,02g x 30 (import równoległy):

### Kiedy nie stosować leku Aescin:

-jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Aescin  
-jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek kobiet w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią

Przeciwwskazania - Aescin tabletki dojelitowe 0,02g x 30 (import równoległy)

Jak każdy lek, Aescin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 100): zaburzenia czynności przewodu pokarmowego

Bardzo rzadko (mniej niż u 1 na 10000 pacjentów): reakcjenadwrażliwości, w tym pokrzywka.

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

## Uwagi:

### Stosowanie leku Aescin z innymi lekami:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Aescin może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych. Niektóre antybiotyki-cefalosporyny mogą nasilać działanie leku. Należy unikać jednoczesnego podawania leku Aescin a antybiotykami aminoglikozydowymi, ze względu na możliwy wpływ na zwiększone toksyczne działanie aminoglikozydów.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**