

Aescin, tabletki powlekane, 90 sztuk

Nasza cena: 43,28 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*90
Postać	Tabletki
Producent	TEVA PHAMACEUTICALS POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ESCINUM

Opis produktu

Opis

Aescin, tabletki powlekane, 90 sztuk

Preparat uszczelniający śródbłonek naczyń krwionośnych stosowany m.in w schorzeniach kończyn dolnych.

Dawkowanie - Aescin, tabletki powlekane, 90 szt.

Lek Aescin tabletki powlekane przeznaczony jest do stosowania doustnego.

Dorośli: zazwyczaj stosowana dawka leku Aescin to 3 razy na dobę po 2 tabletki, po posiłku, popijając dużą ilością płynu. Profilaktycznie można stosować na minimum 16 godzin przed zabiegiem chirurgicznym. Po 2-3 miesiącach leczenia można zastosować leczenie podtrzymujące w dawce 40 mg (2 tabletki) 2 razy na dobę. W przypadku stosowania środków antykoncepcyjnych można przyjmować podwójną dawkę alfa-escyny.

Osoby w podeszłym wieku: nie jest konieczna zmiana dawkowania.

Dzieci: nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Składniki - Aescin, tabletki powlekane, 90 szt.

Substancją czynną leku jest alfa-escyna.

Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, talk, magnezu stearynian.

Otoczka: talk, tytanu dwutlenek, powidon, polisorbát 80, kopolimer kwasu metakrylowego, sodu karboksymetyloceluloza, żółcień pomarańczowa, silikonowa emulsja przeciwiopienna.

Działania

Aescin powoduje szybsze wchłanianie krwiaków pourazowych oraz zmniejsza prawdopodobieństwo ich wystąpienia w okresie

pooperacyjnym (szczególnie po zabiegach chirurgicznych narządu ruchu). Ponadto, uszczelniając śródbłonek naczyń krwionośnych poprawia krążenie żylnolimfatyczne. Lek stosowany jest również w zapobieganiu zakrzepowemu zapaleniu żył w okresie pooperacyjnym, także w leczeniu zaburzeń krążenia żylnego kończyn i żylaków kończyn dolnych.

Wskazania - Aescin, tabletki polwekane, 90 szt.

- Leczenie przewlekłej niewydolności żylniej, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu
- Leczenie zapalenia żył kończyn dolnych
- Profilaktyka i leczenie krwinków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych

Przeciwwskazania - Aescin, tabletki polwekane, 90 szt.

Nie stosować leku Aescin:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Aescin.
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek
- u kobiet w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Przeciwwskazania - Aescin, tabletki polwekane, 90 szt.

Jak każdy lek, Aescin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 100): zaburzenia czynności przewodu pokarmowego
Bardzo rzadko (mniej niż u 1 na 10000 pacjentów): reakcjenadwrażliwości, w tym pokrzywka.

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Uwagi

Stosowanie leku Aescin z innymi lekami:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Aescin może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych. Niektóre antybiotyki-cefalosporyny mogą nasilać działanie leku. Należy unikać jednoczesnego podawania leku Aescin a antybiotykami aminoglikozydowymi, ze względu na możliwy wpływ na zwiększone toksyczne działanie aminoglikozydów.

O tym jak prawidłowo zadbać o swoje nogi dowiedzą się Państwo z artykułu "Problem z nóg - problem z głowy".

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.