


## Aescin, żel, 40g



Nasza cena: 22,24 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	40g
Postać	ZEL
Producent	TEVA PHAMACEUTICALS POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ESCINUM, DIETHYLAMINUM, HEPARINUM

### Opis produktu

#### Opis

Aescin żel to lek o działaniu przeciwobrzękowym, przeciwzapalnym i chroniącym naczynia żyłne.

#### Dawkowanie - Aescin, żel, 40g

Aescin żel przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego, miejscowo na skórę.

Lek należy stosować średnio 3 do 5 razy na dobę przez rozprowadzenie go cienką warstwą, a następnie wcieranie go w chore miejsce i jego okolice.

Masaż poprzedzający stosowanie żelu przyspiesza wchłanianie substancji czynnej.

#### Składniki - Aescin, żel, 40g

Substancjami czynnymi leku są alfa-escyna, salicylan dwuetyloaminy i heparyna

Inne składniki leku to karbomer, trolamina, alkohol izopropylowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, disodu edetynian, woda oczyszczona.

#### Działania

Normalizuje przepuszczalność błony naczyń włosowatych, uszczelnia śródbłonek kapilarów, zmniejsza przepięcie chłonki. Stosowany jest również wspomagająco w zmniejszaniu innych niekorzystnych objawów, takich jak: bóle i ciężkość nóg, swięd skóry, obrzęki kończyn dolnych i skurcze mięśni łydek występujące w zaburzeniach krążenia żylnego kończyn dolnych.

#### Wskazania - Aescin, żel, 40g

Preparat stosowany w zapobieganiu i leczeniu obrzęków, krwiaków pourazowych, i pooperacyjnych (stłuczenia, skręcenia, ortopedia), zaburzeniach krążenia żylnego w kończynach dolnych, żylakach kończyn dolnych, bólach kręgosłupa u chorych z objawami ucisku korzeni nerwów rdzeniowych odcinka szyjnego kręgosłupa (dyskopatie, bóle karku), rwie kulszowej.

## Przeciwwskazania - Aescin, żel, 40g

Nie stosować leku Aescin:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na którykolwiek ze składników leku
- jeśli u pacjenta występuje przewlekła choroba nerek oraz ciężka niewydolność nerek
- u kobiet w pierwszych trzech miesiącach ciąży
- miejscowo na błony śluzowe, na otwarte rany oraz przypadkach martwicy skóry na obszary skóry poddane napromienianiu

## Przeciwwskazania - Aescin, żel, 40g

Bardzo rzadko mogą wystąpić w miejscu stosowania świąd, pokrzywka lub uczucie pieczenia. Objawy te zazwyczaj samoistnie przemijają.

## Uwagi

O tym jak prawidłowo zadbać o swoje nogi dowiedzą się Państwo z artykułu "Problem z nóg - problem z głowy".

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**