

Aesculan maść doodbytnicza, 30 g



Nasza cena: 25,61 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 g
Postać	MASC
Producent	HERBAPOL-POZNAŃ POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	AESCULUS HIPPOCASTANUM, LIDOCAINUM

Opis produktu

Opis

Aesculan maść doodbytnicza, 30 g

Hippocastani corticis extractum siccum + Lidocaini hydrochloridum
(62,5 mg + 5 mg)/g, maść doodbytnicza

Skład:

Substancje czynne: 1 g maści zawiera substancje czynne:

- 62,5 mg wyciągu suchego z *Aesculus hippocastanum* L., cortex, kora (kora kasztanowca) (40-90:1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: metanol 90 % (v/v). - 5 mg lidokainy chlorowodoru (*Lidocaini hydrochloridum*). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: bronopol, lanolina.

Wskazania do stosowania:

Aesculan stosowany jest tradycyjnie u dorosłych w chorobie hemoroidalnej. Stosowany w łagodzeniu objawów choroby hemoroidalnej występujących w pierwszej fazie choroby, charakteryzującej się występowaniem słabo nasilonych objawów bólowych i świądu. Skuteczność preparatu w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania w leczeniu i doświadczeniu. Przyjmuje się, że preparat wykazywać będzie działanie miejscowo znieczulające oraz łagodne przeciwzapalne i ściągające.

Dawkowanie i sposób podawania:

Dorośli:

o ile lekarz nie zaleci inaczej, należy za pomocą załączonej kaniuli nałożyć maść na chore miejsce lub wcisnąć do odbytnicy ok. 0,5 - 1,0 g (pasma maści o długości ok. 2 cm), 2 - 3 razy dziennie, aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć stosując maść raz na dobę. Preparat należy stosować do ustąpienia objawów. Jeżeli po 7 dniach stosowania preparatu nie ma poprawy lub gdy nastąpi zaostrzenie dolegliwości związanych z chorobą hemoroidalną, należy skontaktować się z lekarzem. Sposób podawania

Podanie doodbytnicze. Należy umyć ręce po każdorazowym zastosowaniu produktu.

Dzieci i młodzież:

Nie określono bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci i młodzieży. Zastosowanie preparatu u osób poniżej 18 roku życia wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku Aesculan, jeśli występuje nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu nie należy także stosować u osób uczulonych na amidowe środki miejscowo znieczulające i/lub gdy stwierdzono nadwrażliwość na rośliny z rodziny Asteraceae (dawniej Compositae) np. rumianek.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

W przypadku wystąpienia nasilonego krwawienia z odbytu, krwi w stolcu lub silnych dolegliwości bólowych należy skonsultować się z lekarzem. Bronopol i lanolina mogą wywołać miejscowe podrażnienie skóry (zapalenie skóry kontaktowe).

Działania niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych preparatu Aesculan. Użycie miejscowe preparatów z lidokainą może powodować sporadycznie wystąpienie reakcji uczuleniowej, rzadko wstrząs anafilaktyczny. Olejek eteryczny rumiankowy może wywołać reakcje alergiczne (mogą być spóźnione).

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.