

Afrin Nd aerozol do nosa, 15 ml



Nasza cena: 27,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	15 ml
Postać	AER.D/NOSA
Producent	BAYER POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM

Opis produktu

Opis

Afrin Nd aerozol do nosa, 15 ml

Afrin ND - preparat stosowany do leczenia objawów zatkanego nosa.

Dawkowanie

Stosować co 12h.

Dorośli i dzieci w wieku >10lat: 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego co 12h

Dzieci w wieku 6-10 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego co 12h

Skład

1ml zawiera 0,5mg oksymetazoliny chlorowodorku

Substancje pomocnicze: disodu edetynian, disodu fosforan bezwodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, powidon K29-32, benzalkoniowy chlorek, makrogl 1450, woda oczyszczona, alkohol benzylovowy, celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa, aromat cytrynowy

Działanie

Działanie preparatu Afrin ND rozpoczyna się już w ciągu kilku minut od jego podania i może utrzymywać się nawet do 12 godzin. Opatentowana formuła No Drip sprawia, że lek ten trafia dokładnie w źródło zatkanego nosa, pozostaje na jego błonie śluzowej i nie ścieka do gardła. W Afrin ND wykorzystano mieszanę polimerów, które zwiększają lepkość substancji płynnej. Właśnie dlatego, po aplikacji sprayu do jamy nosowej, preparat pozostaje w miejscu rozpylenia. Dzięki formule No Drip, Afrin ND trafia i działa dokładnie tam, gdzie go potrzebujemy. Substancją aktywną w produkcie Afrin ND jest chlorowodorek oksymetazoliny (0,5mg/ml). Powoduje ona zwężenie naczyń krwionośnych w błonie śluzowej nosa, zaś zmniejszony przepływ krwi wpływa na ograniczenie obrzęku błony śluzowej. Dzięki temu poprawia się drożność przewodów nosowych, dodatkowo zatoki przynosowe są lepiej wentylowane i ułatwiony jest odpływ zalegającej w nich wydzieliny.

Wskazania

Preparat stosowany w leczeniu objawów zatkanego nosa spowodowanych:

- przeziębieniem
- katarciem siennym
- zapaleniem zatok

Przeciwwskazania

Pacjenci ze stwierdzoną wrażliwością na leki sympatykomimetyczne lub którykolwiek ze składników produktu leczniczego. Nie należy stosować produktu Afrin ND u pacjentów: przyjmujących inhibitory monoaminoooksydazy (MAO) lub pacjentów, którzy przyjmowali je w okresie ostatnich 2 tygodni, z jaskrą z wąskim kątem przesączania, po przezklinowym usunięciu przysadki, ze stwierdzoną nadwrażliwością lub idiosynkrazją na którykolwiek składnik produktu, z zapaleniem skóry i błony śluzowej przedstonka nosa oraz suchym zanikowym zapaleniem błony śluzowej nosa, z ostrą chorobą wieńcową i lewokomorową niewydolnością serca („astmą sercową”). Produktu Afrin ND nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.