

# Agen 5 30 tabletek 5 mg

Nasza cena: 2,41 zł

## Opis słownikowy

Dawka	5 MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	ZENTIVA K.S. CZECHY [CZ]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	AMLODIPINUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

Zaleca się stosowanie leku gdy u pacjenta występuje:

- Nadciśnienie tętnicze,
- Przewlekła, stabilna dławica piersiowa,
- Naczynioskurczowa dławica piersiowa (typu Prinzmetal).

### Dawkowanie:

Dawka początkowa wynosi 5 mg na dobę,

Istnieje możliwość zwiększenia dawki maksymalnie do 10 mg na dobę. Dawka leku jest ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta. Nie należy samodzielnie zmieniać zalecanej dawki.

### Działanie:

#### Przyjmowanie leku wpływa na:

- obniżenie ciśnienia tętniczego wynika to z działania amlodypiny bezpośrednio zwiotczającej mięśnie gładkie ściany naczyń krwionośnych.
- zmniejsza obszar niedokrwionego uszkodzenia mięśnia sercowego

- działa rozkurczająco na obwodowe tętniczki, co powoduje redukcję całkowitego oporu obwodowego i prowadzi do zmniejszenia obciążenia następczego (ang. afterload) czyli siły, z jaką serce musi wypompowywać krew na obwód.

#### **Dodatkowo mechanizm działania amlodypiny obejmuje:**

- rozkurczanie dużych tętnic i tętniczek wieńcowych, zarówno w obszarach niedokrwionych, jak i prawidłowo ukrwionych. Poprzez rozszerzenia naczyń następuje poprawa dopływu tlenu do mięśnia serca u pacjentów ze skurczem tętnic wieńcowych (dławica naczynioskurczowa Prinzmetal).

#### **Skład:**

1 tabl. zawiera 5 mg amlodypiny.

#### **Przeciwwskazania:**

##### **Nie należy stosować leku jeżeli u pacjenta stwierdzono:**

- nadwrażliwość na amlodypinę, dihydropirydyny lub substancje pomocnicze zawarte w preparacie,
- wstrząs kardiogeny,
- klinicznie znaczące zwężenie aorty,
- niestabilna choroba niedokrwienna serca,
- ciąża i okres karmienia piersią.

#### **Działania niepożądane:**

**Podczas przyjmowania leku mogą występować działania niepożądane objawiające się między innymi poprzez:**

- zmiany nastroju,
- ból głowy,
- zawroty głowy,
- senność,
- zaburzenia widzenia,
- szumy uszne,
- kołatanie serca,
- uderzenia gorąca,
- zapalenie naczyń,
- niedociśnienie tętnicze,
- duszność,
- kaszel,
- zapalenie błony śluzowej nosa,

- nudności,
- ból brzucha,
- niestrawność,
- zwiększona potliwość,
- łysienie,
- przebarwienia skóry,
- ból stawów,
- ból mięśni,
- kurcze mięśni,
- ból pleców.
- obrzęk,
- obrzęki obwodowe,
- uczucie zmęczenia.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.