

# Aklief krem 30g

Nasza cena: 100,46 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	30 g
Postać	KREM
Producent	Galderma Sp. Z O.o. Polska [PI]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	TRIFAROTENUM

## Opis produktu

### Opis

## Aklief krem 30 g

### Wskazania

#### Co to jest Aklief krem? Kiedy się go stosuje?

Aklief to lek zawierający substancję czynną z grupy retinoidów - trifaroten. Lek stosuje się w leczeniu trądziku pospolitego (Acne vulgaris) twarzy i tułowia u pacjentów w wieku od 12 lat i starszych oraz w przypadku występowania licznych zaskórników (otwartych i zamkniętych), grudek i krost (zapalnych).

### Skład

- Substancją czynną leku Aklief jest trifaroten. Jeden gram kremu zawiera 50 mikrogramów trifarotenu.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: alantoina, Simulgel 600 PHA (kopolimer akryloamidu i sodu akryloildimetylotaurynianu, izohexadekan, polisorb 80, sorbitanu oleinian), cyklometykon, etanol 96%, fenoksyetanol, glikol propylenowy, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, woda oczyszczona.

### Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Lek Aklief jest przeznaczony do stosowania

- tylko na skórze twarzy lub tułowia u pacjentów w wieku od 12 lat i starszych.
- Nie należy stosować tego leku na innych obszarach ciała.
- Nie połykać.

## Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy kilka razy nacisnąć pompkę dozującą (maksymalnie 10 razy), aż do pojawienia się niewielkiej ilości kremu. Tak przygotowana pompka jest gotowa do użycia. Cienką warstwę kremu Akliief należy nanosić na chorobowo zmienione miejsca na twarzy (czoło, nos, podbródek, prawy i lewy policzek) oraz na chorobowo zmienione miejsca na tułowie, raz na dobę, wieczorem, na umytą i osuszoną skórę:

- Jedna (1) doza powinna wystarczyć na pokrycie twarzy (np. czoła, policzków, nosa i brody).
- Dwie (2) dozy powinny wystarczyć na pokrycie górnej części tułowia (np. górnej części pleców, ramion i klatki piersiowej). Można zastosować jedną (1) dodatkową dozę, jeśli trądzik występuje także w środkowym i dolnym obszarze pleców.
- Nie należy stosować więcej niż czterech (4) doz w ciągu doby.
- Należy unikać kontaktu z oczami, powiekami, ustami i błonami śluzowymi (np. wewnątrz nosa i jamy ustnej).
- Po zastosowaniu leku należy natychmiast umyć ręce.
- Od czasu rozpoczęcia leczenia, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, zaleca się zastosowanie preparatu nawilżającego.

Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo należy stosować lek Akliief. Po trzech miesiącach od rozpoczęcia leczenia lekarz oceni poprawę trądziku.

## Pominięcie zastosowania dawki

Jeżeli pacjent zapomni zastosować wieczorem krem Akliief, kolejną dawkę powinien zastosować następnego wieczoru. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

## Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Stosowanie leku w nadmiarze nie przyspiesza i nie polepsza wyniku leczenia, a może być przyczyną znacznego podrażnienia, złuszczenia i zaczerwienienia skóry.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalnym oddziałem zatruc:

- jeśli lek przypadkowo zastosowało dziecko,
- jeśli pacjent lub inna osoba przypadkowo połknęła lek.
- Lekarz poradzi, co należy dalej zrobić.

## Stosowanie u dzieci

Nie należy stosować kremu u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

## Akliief a alkohol, jedzenie i picie

Brak danych. Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

## Ciąża i karmienie piersią

Nie wolno stosować leku Akliief w trakcie ciąży lub gdy pacjentka planuje zajście w ciążę.

W przypadku zajścia w ciążę w czasie stosowania leku Akliief, należy przerwać leczenie i jak najszybciej poinformować o tym lekarza.

Podczas stosowania leku istnieje ryzyko, że substancja czynna zawarta w kremie przenika do mleka matki dlatego zagrożenie dla noworodka i (lub) niemowlęcia nie może zostać wykluczone.

Lekarz razem z pacjentem musi podjąć decyzję czy zastosować lek czy karmić piersią, uwzględniając korzyści z leczenia dla matki oraz korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią.

Aby zapobiec spożyciu i (lub) narażeniu niemowlęcia na kontakt z lekiem, karmiące piersią matki nie powinny nanosić kremu na klatkę piersiową.

## Działania niepożądane / skutki uboczne

## Jakie działania niepożądane / skutki uboczne

Podczas stosowania kremu Akliel mogą często wystąpić reakcje w miejscu podania, takie jak zaczerwienienie, łuszczenie, suchość oraz kłucie i (lub) pieczenie skóry.

### Jakie są częste działania niepożądane ?

- Podrażnienie w miejscu podania,
- swędzenie skóry (świąd),
- oparzenie słoneczne.

### Jakie są niezbyt częste efekty uboczne?

- Ból skóry,
- Suchość skóry,
- Odbarwienie (utrata pigmentacji skóry),
- Erozja (nadżerkaskóry),
- Wysypka,
- Obrzęk,
- Podrażnienie skóry,
- Trądzik,
- Alergiczne zapalenie skóry (alergia skórna)
- Rumień (zaczerwienienie)

### Jakie są rzadkie efekty uboczne ?

- Pokrzywka
- Pęcherzyki
- Wyprysk „asteatotyczny” (sucha skóra z łuskami i pęknięciami)
- Łojotokowe zapalenie skóry (czerwona, łuszcząca się i swędząca skóra)
- Uczucie pieczenia skóry
- Pękanie skóry
- Przebarwienie skóry (nadmierna pigmentacja skóry)
- Złuszczenie powiek (złuszczenie skóry powieki) lub obrzęk (obrzęk skóry powieki)
- Spierzchnięte usta
- Zaczerwienienie skóry twarzy

## Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

## Ulotka do pobrania

Akliel krem

### Podmiot odpowiedzialny:

Galderma Sp. z o.o.

ul. Puławska 14502-715 Warszawa Polska

Powyższe informacje mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu dołączonej do opakowania, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

**Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz**

informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.