

Akneroxid 5%, żel 50 g



Nasza cena: 25,60 zł

Opis słownikowy

Dawka	5%
Opakowanie	50 g
Postać	ZEL
Producent	HERMAL ALMIRALL NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	BENZOYLIS PEROXIDUM

Opis produktu

Opis

Akneroxid 5 ma postać żelu, jest lekiem przeciwtrądzikowym do stosowania miejscowego na skórę. Zawiera substancję czynną benzoilu nadtlenuk.

Dawkowanie - Akneroxid 5%, żel 50 g

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek Akneroid 5 zwykle stosuje się 1 lub 2 razy na dobę. W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Pacjenci ze szczególnie wrażliwą skórą, początkowo powinni stosować lek Akneroid 5 raz na dobę, przed ułożeniem się do snu. Po dokładnym oczyszczeniu skóry lek Akneroid 5 nakłada się cienką warstwą na chorobowo zmienioną skórę. Leku nie należy nakładać na zdrową skórę. Po użyciu leku należy dokładnie umyć ręce. Średni okres leczenia wynosi od 4 do 10 tygodni.

Składniki - Akneroxid 5%, żel 50 g

(1 g) 50 mg benzoilu nadtlenuku, makrogol eter laurylowy, karbomer 940, wodorotlenek sodu, kwas edetynowy, woda oczyszczona.

Działania

Hamuje rozwój bakterii beztlenowych *Propionibacterium acnes*, będących jedną z przyczyn powstawania trądziku pospolitego.

Wskazania - Akneroxid 5%, żel 50 g

Trądzik pospolity.

Przeciwwskazania - Akneroxid 5%, żel 50 g

Leku Acneroxid nie należy stosować:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną nadtlenek benzoilu lub jakąkolwiek substancję pomocniczą leku,
- na uszkodzoną skórę,
- do oczu,
- na błony śluzowe,
- w okolicach ust, nosa lub oczu,
- na skórę suchą i łojotokową,
- u osób z atopowym zapaleniem skóry.

Przeciwwskazania - Akneroxid 5%, żel 50 g

Po rozpoczęciu stosowania leku Akneroxid 5, w pierwszych dniach leczenia może wystąpić uczucie napięcia i niewielkie zaczerwienienie skóry, które zwykle ustępuje podczas leczenia.

Umiarkowane złuszczenie się naskórka utrzymuje się przez cały okres terapii. Gdyby nadmierne zaczerwienienie albo uczucie pieczenia utrzymywało się przez okres ponad 5 dni, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku Akneroxid może sporadycznie powodować nasilenie suchości skóry. W rzadkich przypadkach może wystąpić alergia kontaktowa.

Uwagi

Leku Akneroxid 5 nie należy stosować w ostatnim miesiącu ciąży. Lekarz zdecyduje, czy lek można stosować w pozostałym okresie ciąży i w czasie karmienia piersią, po rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści leczenia.

Okres ważności po otwarciu tuby - 6 miesięcy.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.