

## Akneroxid, żel 10%, 50 g



Nasza cena: 29,27 zł

### Opis słownikowy

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Dawka             | 10 %                        |
| Opakowanie        | 50g                         |
| Postać            | ZEL                         |
| Producent         | HERMAL ALMIRALL NIEMCY [DE] |
| Rejestracja       | Lek bez recepty             |
| Substancja czynna | BENZOYLIS PEROXIDUM         |

### Opis produktu

#### Opis

Akneroxid 10 ma postać żelu, jest lekiem przeciwtrądzikowym do stosowania miejscowego na skórę. Zawiera substancję czynną benzoilu nadtlenuk.

#### Dawkowanie - Akneroxid, żel 10%, 50 g

Do stosowania miejscowego na skórę. O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek Akneroxid 10 zwykle stosuje się raz lub dwa razy na dobę. Pacjenci ze szczególnie wrażliwą skórą, początkowo powinni stosować lek Akneroxid 10 raz na dobę, przed ułożeniem się do snu.

#### Składniki - Akneroxid, żel 10%, 50 g

Substancją czynną leku jest benzoilu nadtlenuk. 1 g żelu zawiera 100 mg benzoilu nadtlenuku. Inne składniki to eter laurylowy makrogolu, karbomer 940, sodu wodorotlenek, kwas edetynowy, woda oczyszczona.

#### Działania

Benzoilu nadtlenuk, po zastosowaniu na skórę hamuje rozwój bakterii beztlenowych *Propionibacterium acnes*, będących jedną z przyczyn powstawania trądziku pospolitego.

#### Wskazania - Akneroxid, żel 10%, 50 g

Trądzik pospolity, zwłaszcza klatki piersiowej i pleców.

#### Przeciwwskazania - Akneroxid, żel 10%, 50 g

Leku Acneroxid 10 nie należy stosować:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną nadtlenek benzoilu lub jakąkolwiek substancję pomocniczą leku,
- na uszkodzoną skórę,
- do oczu,
- na błony śluzowe,
- w okolicach ust, nosa lub oczu,
- na skórę suchą i łojotokową,
- u osób z atopowym zapaleniem skóry.

### Przeciwwskazania - Akneroxid, żel 10%, 50 g

Po rozpoczęciu stosowania leku Akneroxid 10, w pierwszych dniach leczenia może wystąpić uczucie napięcia i niewielkie zaczerwienienie skóry, które zwykle ustępuje podczas leczenia.

Umiarkowane złuszczenie się naskórka utrzymuje się przez cały okres terapii. Gdyby nadmierne zaczerwienienie albo uczucie pieczenia utrzymywało się przez okres ponad 5 dni, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku Akneroxid może sporadycznie powodować nasilenie suchości skóry. W rzadkich przypadkach może wystąpić alergia kontaktowa.

### Uwagi

Leku Akneroxid 10 nie należy stosować w ostatnim miesiącu ciąży. Lekarz zdecyduje, czy lek można stosować w pozostałym okresie ciąży i w czasie karmienia piersią, po rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści leczenia.

Okres ważności po otwarciu tuby - 6 miesięcy.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**