

Alantan Plus, maść 30g



Nasza cena: 9,46 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 g
Postać	MASC
Producent	UNIA SPÓŁDZIELNIA PRACY WARSZAWA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ALLANTOINUM, ACIDUM PANTHOTENICUM

Opis produktu

Opis

Alantan Plus, maść 30g

Lek polecany do leczenia i pielęgnacji skóry.

Dawkowanie

Produkt leczniczy Alantan Plus w postaci maści jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Miejsca chorobowo zmienione należy smarować raz lub kilka razy na dobę.

W przypadku pielęgnacji niemowląt stosować po każdej zmianie pieluchy, po uprzednim przemyciu wodą miejsc narażonych na odparzenia.

Skład

1 g maści zawiera 20 mg alantoiny (Allantoinum) i 50 mg deksopantenolu (Dexpanthenolum) w postaci 50% roztworu pantenolu w glikolu propylenowym.

Substancje pomocnicze: Lanolina, parafina ciekła, wazelina biała, etylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Działanie

Działanie alantoiny:

- Alantoina ma działanie keratolityczne. Działa na desmosomy, które są odpowiedzialne za przyczepność korneocytów.
- Alantoina stosowana regularnie w nadmiernym rogowaceniu skóry, może zapobiec nadmiernemu odkładaniu się keratyny.
- Alantoina wspomaga leczenie ran, gdyż stymuluje wzrost nowej tkanki.

- Alantoina działa osłaniająco na skórę.
- Alantoina poprawia nawilżenie skóry.

Działanie deksopantenolu:

- Deksopantenol głęboko wnika w skórę, gdzie przekształca się w kwas pantotenowy. Zwiększone zapotrzebowanie na kwas pantotenowy występuje w przypadku uszkodzeń i różnego rodzaju zaburzeń skóry.
- Deksopantenol ma zdolność wiązania wody, dzięki czemu zwiększa elastyczność skóry.

Wskazania

Preparat stosowany w leczeniu różnego rodzaju ran (otarcia, niewielkie skaleczenia itp.); oparzeń (w tym słonecznych oraz po radioterapii); pielęgnacji sutków podczas karmienia piersią, przy zapobieganiu odparzeniom u niemowląt. Polecany do pielęgnacji skóry podrażnionej i wysuszonej, nadmiernym rogowaceniu skóry dłoni i stóp. Wspomagająco w leczeniu atopowego zapalenia skóry, wyprysku alergicznego, zapaleniu błony śluzowej nosa i owrzodzeniach podudzi.

Przeciwwskazania

- w nadwrażliwości na alantoinę, deksopantenol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego,
- do oczu,
- na zmiany skórne w okresie ostrego stanu zapalnego z obecnością zmian sączących.

Możliwe działania niepożądane

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, podrażnienie skóry

Uwagi

Ostrzeżenie specjalne: w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów nadwrażliwości na skórze w miejscu stosowania preparatu (zaczerwienienie, uczucie swędzenia) należy przerwać stosowanie preparatu i zastosować leczenie objawowe.

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, produkt leczniczy może powodować podrażnienie skóry.

Ze względu na zawartość lanoliny, produkt leczniczy może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ze względu na zawartość etylu parahydroksybenzoesu, produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.