

Albivag Gel Żel dopochwowy, 30ml



Nasza cena: 29,69 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 ml
Producent	Kadefarm Sp Z O.o. Polska [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Albivag Gel Żel dopochwowy, 30ml

Albivag® Gel wspomaga leczenie infekcji grzybiczych i bakteryjnych pochwy i sromu

Wskazania do stosowania

- w przypadku wystąpienia suchości pochwy (w okresie menopauzy, połogu i karmienia piersią, podczas leczenia hormonalnego, podczas stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych,
- w przypadku rozpoznania zapalenia pochwy i sromu lub w wyniku stresu);
- w przypadku pieczenia, swędzenia, bólu, nieprzyjemnego zapachu i podrażnień – zapewnia szybką ulgę;
- w diagnostyce bakteryjnego lub drożdżakowego zapalenia pochwy (kandydoza) – przywraca fizjologiczne nawilżenie nabłonka błony śluzowej pochwy i sromu oraz naturalne pH pochwy niezbędne do zmniejszenia ryzyka infekcji;
- podczas leczenia infekcji pochwy – zapewnia nawilżenie i ukojenie;
- w przypadku bolesnego współżycia (dyspareunia) oraz po zabiegach ginekologicznych; wspomagająco w leczeniu i zapobieganiu mikrourazów nabłonka błony śluzowej pochwy i krocza;
- w celu zapobiegania podrażnieniom i otarciom spowodowanym przez bieliznę, wkładki i podpaski higieniczne;
- przy zabiegach takich jak DTC (koagulacja diatermiczna), laseroterapia, krioterapia i radioterapia.

Właściwości

Albivag® gel jest wyrobem medycznym stosowanym wspomagająco w leczeniu różnych dolegliwości wywołanych atrofią nabłonka błony śluzowej pochwy i sromu lub związanych z suchością pochwy, u kobiet w wieku rozrodczym lub w okresie menopauzy.

Atrofia nabłonka błony śluzowej pochwy i sromu wiąże się z szeregiem objawów, takich jak suchość, pieczenie, swędzenie, ból, nieprzyjemny zapach, a także mikrourazy i podrażnienia. Dzięki swojej składowi, opartemu na naturalnych składnikach, zapewnia skuteczne nawilżenie i ochronę nabłonka błony śluzowej pochwy i sromu, łagodząc typowe objawy atrofii.

Unikalna formuła na bazie kwasy hialuronowego, izoflawonów sojowych, malwy, aloesu, nagietka lekarskiego oraz olejku z drzewa herbacianego pielęgnuje i przywraca naturalną elastyczność, a także miękkość i integralność nabłonka błony śluzowej pochwy, zapobiegając podrażnieniom i zapewniając nawilżenie i ukojenie.

Dzięki zawartości kwasy borney preparat pozwala na utrzymanie fizjologicznego, kwaśnego odczynu środowiska pochwy,

wzmacniając naturalne działanie ochronne jej flory bakteryjnej i tym samym przyczyniając się do zmniejszenia ryzyka nawracających infekcji.

Jak stosować wyrób Albivag® gel?

- Dokładnie umyj ręce. Przebij otwór tubki nakrętką, a następnie umieść jednorazowy aplikator w szyjce tubki.
- Ostrożnie wyciśnij żel z tubki, aby napęścić aplikator do momentu zatrzymania się tłoka.
- Odkręć aplikator z tubki i delikatnie włóż go do pochwy. Przesuń tłok, aby wycisnąć żel.
- Zaleca się nałożenie niewielkiej ilości produktu na aplikator w celu ułatwienia wprowadzenia go do pochwy.
- Zakręć ostrożnie tubkę, a zużyty jednorazowy aplikator wyrzuć do kosza na śmieci.

Dawkowanie

Żel dopochwowy Albivag® gel należy stosować raz dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Za każdym razem należy używać nowego aplikatora.

Nie należy przekraczać przepisanej dawki bez konsultacji z lekarzem.

Albivag® gel jest środkiem na bazie wody. Nie pozostawia plam na ubraniu i może być używany podczas stosowania prezerwatywy.

Skład

kwasy hialuronowy, ekstrakt sojowy (miareczkowany w 40% roztworze izoflawonów i 25% roztworze genisteiny), glikolowy ekstrakt z malwy, kwas borny, destylowana woda nagietkowa, olejek eteryczny z drzewa herbacianego (tea tree), aloes zwyczajny (aloe vera), ksylitol, karbomer, hydroksyetyloceluloza, trietanolamina, disodium EDTA, uwodniony olej rycynowy PEG-40, dehydrooctan sodu, mocznik imidazolidynowy, substancja zapachowa, woda.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.