

Alka-Seltzer, 10 tabletek musujących



Nasza cena: 23,13 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	TABL.MUS.
Producent	BAYER AG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM

Opis produktu

Opis

Alka-Seltzer, 10 tabletek musujących

Preparat stosowany w dolegliwościach bólowych o lekkim i średnim nasileniu.

Dawkowanie - Alka-Seltzer, 10 tabletek musujących

Dorośli - rozpuścić 1 do 3 tabletek w wodzie i wypić płyn musujący.

Dzieci powyżej 12 lat - przy grypie i przeziębieniu przed podaniem leku należy skonsultować się z lekarzem. Należy przyjąć 1 tabletkę musującą jednorazowo (324 mg kwasu acetylosalicylowego). W razie potrzeby dawka jednorazowa może być powtarzana do 3 razy na dobę co 4-8 godzin. Maksymalna dawka dobową wynosi 3 tabletki musujące.

Leku nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Składniki - Alka-Seltzer, 10 tabletek musujących

Każda tabletkę zawiera substancję czynną 324 mg kwasu acetylosalicylowego oraz substancje pomocnicze.

Działanie

Kwas acetylosalicylowy, substancja czynna zawarta w preparacie Alka-Seltzer, działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo. Cytrynian sodu, powstający po rozpuszczeniu tabletki w wodzie, ma właściwości buforujące, dzięki czemu zobojętnia nadmiar kwasu solnego w żołądku.

Wskazania - Alka-Seltzer, 10 tabletek musujących

Preparat stosowany w dolegliwościach bólowych o lekkim i średnim nasileniu np. ból głowy, bóle mięśniowe (m.in. z uczuciem ogólnego rozbicia), bóle zębów. Ból i gorączka w przebiegu przeziębienia i grypy.

Przeciwwskazania - Alka-Seltzer, 10 tabletek musujących

Nie stosować:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek składnik leku,
- u pacjentów ze skazą krwotoczną,
- w chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy,
- u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek,
- u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby
- u pacjentów z ciężką niewydolnością serca
- w ostatnim trymestrze ciąży,
- jeśli w przeszłości występowały napady astmy oskrzelowej, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych
- jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15mg na tydzień lub większych
- w chorobach wirusowych (szczególnie grypa i ospa wietrzna) u dzieci do 12 lat.

Działania nieporządane - Alka-Seltzer, 10 tabletek musujących

Rzadko występują dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takie jak: nudności, biegunka, wymioty oraz niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego, które w wyjątkowych przypadkach mogą prowadzić do niedokrwistości. Czasami może dochodzić do rozwoju wrzodów trawiennych z krwawieniem i perforacją. Jeżeli wystąpią czarne, smoliste stolce, należy odstawić lek i zgłosić się do lekarza.

Rzadko dochodzi do reakcji nadwrażliwości (w postaci np. napadów duszności lub reakcji skórnych).

Opisano pojedyncze przypadki zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz) i nerek, obniżenia stężenia glukozy we krwi oraz reakcji skórnych o szczególnie ciężkim przebiegu.

Zawroty głowy oraz szumy uszne, zwłaszcza u dzieci i osób starszych, mogą być objawami przedawkowania

Uwagi

Ciąża i karmienie piersią: Kwas acetylosalicylowy może być stosowany w 1 i 2 trymestrze ciąży tylko po rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści, wyłącznie na zlecenie lekarza.

Preparatu nie należy stosować w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować wady płodu i komplikacje w czasie porodu.

Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkich ilościach do mleka matki, dlatego - jeżeli to możliwe - należy unikać stosowania preparatu w czasie karmienia piersią.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.