

# Allergocrom, krople do oczu, 2%, 10 ml

Nasza cena: 14,60 zł



## Opis słownikowy

Dawka	2%
Opakowanie	10 ml
Postać	KROPLE DO OCZU
Producent	URSAPHARM ARZNEMITTEL GMBH NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ACIDUM CROMOGLICICUM

## Opis produktu

### Opis

## Allergocrom, krople do oczu, 2%, 10 ml

Przeciwalergiczne krople do oczu.

### Dawkowanie - Allergocrom, krople do oczu, 2%, 10 ml

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Zazwyczaj zaleca się zakropić do worka spojówkowego 1 kroplę 4 razy na dobę. Dla dorosłych i dla dzieci dawkowanie jest takie samo. Leczenie preparatem Allergocrom krople do oczu nie należy przerywać po ustąpieniu objawów, należy je kontynuować aż do ustania kontaktu z alergenem np.: pyłkami kwiatów, kurzem.

### Składniki - Allergocrom, krople do oczu, 2%, 10 ml

1 ml roztworu zawiera 20 mg kromoglikanu sodu.

Składniki - Allergocrom, krople do oczu, 2%, 10 ml pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, glukoza jednowodna, woda do wstrzykiwań.

### Wskazania - Allergocrom, krople do oczu, 2%, 10 ml

Preparat stosowany w ostrym i przewlekłym alergicznym zapaleniu spojówek, np.: zapalenie spojówek spowodowane katarem siennym, wiosenne alergiczne zapalenie rogówki i spojówek.

### Przeciwwskazania - Allergocrom, krople do oczu, 2%, 10 ml

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

### Przeciwwskazania - Allergocrom, krople do oczu, 2%, 10 ml

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić przemijające pieczenie oczu, uczucie obecności ciała obcego w oku, przekrwienie i obrzęk spojówek. Objawy te samoistnie ustępują. U niektórych osób mogą wystąpić także inne działania niepożądane.

### Uwagi

Przed zastosowaniem leku w okresie ciąży i karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Więcej na temat alergii dowiedzą się Państwo z artykułu "Jesienne alergie."

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**