

Allertec Wzf, lek przeciwalergiczny, 10 mg, 7 tabletek - Cetyryzyna

Nasza cena: 12,66 zł



Opis słownikowy

Dawka	10MG
Opakowanie	*7
Postać	Tabletki
Producent	POLFA S.A. WARSZAWA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CETIRIZINUM

Opis produktu

Opis

Allertec WZF lek przeciwalergiczny

Dawkowanie

Stosować doustnie.

- Dorośli i dzieci od 12 lat - 1 tabletkę raz dziennie.
- Dzieci od 6 do 12 lat - 1/2 tabletki dwa razy na dobę.
- Dzieci o masie mniejszej niż 30 kg - 1/2 tabletki raz dziennie.
- Dzieci poniżej 6 lat - zaleca się stosowanie cetyryzyny w postaci kropli lub syropu.

Skład

(1 tabletkę) chlorowodorek cetyryzyny 10 mg, substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, powidon K-25, magnezu stearynian, karoksyloskrobię sodowa, krzemionkę koloidalną bezwodną, sodu laurylosiarczan, hypromelozę, makrogol 6000

Wskazania

Allertec WZF to lek przeciwalergiczny, który stosuje się:

- w przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa,
- w sezonowym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa,
- w alergicznym zapaleniu spojówek,

- w przewlekłej idiopatycznej pokrzywce.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu, krańcowa niewydolność nerek.

Senność, zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy, pobudzenie, suchość w jamie ustnej, ból brzucha, nudności, biegunka, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa.

Pojedyncze przypadki: zmniejszenie liczby płytek krwi, nadwrażliwość, wstrząs anafilaktyczny, zaburzenia krążenia, spadek ciśnienia tętniczego, duszność, obrzęki, świąd, pokrzywka, pobudzenie, agresja, dezorientacja, depresja, omamy, bezsenność, tiki, drgawki, zaburzenia smaku, zaburzenia ruchu, mimowolne ruchy kończyn i ciała, parastezje, omdlenie, drżenie, zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacyjne ruchy gałek ocznych, przyspieszenie czynności serca, biegunka, zaburzenia czynności wątroby.

Uwagi

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem [Cała prawda o alergii](#)

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.