

## Alliofil, 30 tabletek dojelitowych



Nasza cena: 11,03 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	TABL.DOJELIT.
Producent	HERBAPOL-POZNAŃ POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ALLIUM SATIVUM, URTICA DIOICA

### Opis produktu

#### Opis

### Alliofil, 30 tabletek dojelitowych

Alliofil jest produktem leczniczym roślinnym stosowanym tradycyjnie, którego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

### Dawkowanie - Alliofil, 30 tabletek dojelitowych

W łagodnych postaciach hiperlipidemii i w profilaktyce miażdżycy: dorośli 3 razy dziennie po 1-2 tabletki. W profilaktyce infekcji górnych dróg oddechowych: dorośli 3 razy dziennie po 3-6 tabletek.

Lek przyjmować po głównych posiłkach. Nie należy rozgryzać tabletek. Skuteczność obserwuje się po przyjmowaniu leku przez dłuższy czas.

### Składniki - Alliofil, 30 tabletek dojelitowych

(1 tabletki) Czosnek suszony 200 mg; sproszkowany liść pokrzywy 53,5 mg. Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna typ 112, celuloza mikrokrystaliczna typ 200, myvatex, magnezu stearynian, powidon, talk, acetylocelulozy ftalan, trietylu cytrynian, pólisorbat 80, lak indygotyny E132, talk żółcieni cholinowej E104.

### Wskazania - Alliofil, 30 tabletek dojelitowych

Lek Alliofil stosuje się tradycyjnie w łagodnych postaciach hiperlipidemii, w profilaktyce miażdżycy i profilaktyce górnych dróg oddechowych.

### Przeciwwskazania - Alliofil, 30 tabletek dojelitowych

Nie należy stosować leku Alliofil w przypadku: uczulenia na związki siarkowe, niewydolności wątroby, astmy oskrzelowej oraz alergii pokarmowej. Związki siarkowe czosnku wydalone są przez skórę z potem oraz przez płuca, co w konsekwencji powoduje zmianę

zapachu skóry i oddechu. Ciąża i okres karmienia piersią.

### Przeciwwskazania - Alliofil, 30 tabletek dojelitowych

W trakcie stosowania możliwe jest wystąpienie skórnych odczynów alergicznych oraz zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

### Uwagi

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią, ponieważ związki siarkowe czosnku przechodzą do mleka matki powodując zmianę jego zapachu.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**