

# ALPICORT 100 ML

Nasza cena: 40,58 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	100 ml
Postać	PLYN
Producent	Dr August Wolff Niemcy [De]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	PREDNISOLONUM, ACIDUM SALICYLICUM

## Opis produktu

### Opis

### Skład:

1 ml płynu na skórę zawiera 2 mg prednizolonu (Prednisolonum) i 4 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum)

### Wskazania do stosowania:

Wypadanie włosów w przebiegu chorób takich jak: łuszczyca owłosionej skóry głowy, wyprysk łojotokowy, łojotok, łysienie plackowate, rozlane wypadanie włosów, jak również ż po zakażeniach ogólnoustrojowych.

### Dawkowanie i sposób podawania:

#### Dawkowanie:

Stosować jeden raz na dobę, najlepiej wieczorem.

Gdy tylko objawy zapalne nieco ustąpią, wystarczy stosowanie 2 do 3 razy w tygodniu.

W tym celu nanosić produkt otworem aplikatora skierowanym do dołu, na leczone miejsca.

Następnie masować palcami skórę głowy przez 2–3 minuty.

Czas trwania leczenia małych powierzchni nie powinien, ze względu na obecność w roztworze prednizolonu, być dłuższy niż 2–3 tygodnie. Do świadczenia kliniczne obejmuje okres leczenia do 6 miesięcy. Nie prowadzono badań dotyczących czasu utrzymywania się działania po odstawieniu produktu.

### Dzieci i młodzież

Alpicort jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku 0–12 lat (patrz punkt 4.3).

U dzieci powyżej 12 lat produkt nie powinien być stosowany na zbyt dużą powierzchnię ciała i (lub) przez zbyt długi czas.

### Sposób stosowania:

Do stosowania na skórę głowy.

### Przeciwwskazania:

#### Alpicort jest przeciwwskazany:

- w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
- u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 12 lat,
- w okolicach błon śluzowych, w jamie ustnej, do lub w okolicach oczu oraz w okolicach genitaliów, względnie wewnętrznie,
- w przypadku ospy wietrznej, szczególnych schorzeń skóry (gruźlica, kiła) i zapalnych reakcjach na szczepienia,
- przy grzybicach i bakteryjnych zakażeniach skórnych,
- w przypadku okołoustnych chorób zapalnych skóry (ob jawy podrażnienia skóry wokół ust z zaczerwienieniem i guzkami) i trądziku różowatego.

### Działania niepożądane:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: nadwrażliwość skórna (alergiczny wykwit kontaktowy)

Bardzo rzadko: zmiany skórne (zmniejszenie grubości skóry, poszerzenie małych naczyń krwionośnych, tworzenie się pasemek, trądzik sterydowy, okołoustne zapalenie skóry, nadmierne owłosienie ciała)

Zaburzenia oka

Nie znana: nieostre widzenie

Ponadto możliwe są krótkotrwałe podrażnienia skóry (np. pieczenie, zaczerwienienie).

Podczas długotrwałego stosowania (ponad 2–3 tygodnie) lub na dużych powierzchniach (np. cała skóra głowy) oraz w przypadku stosowania niezgodnego z przeznaczeniem możliwe jest działanie ogólnoustrojowe kortykosteroidów.

Wszystkie działania zostały szczegółowo opisane w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.