

ALPICORT E (IMP.ROW.) 100 ML

Nasza cena: 54,80 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	100 ml
Postać	PLYN
Producent	INPHARM SP. Z O. O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	PREDNISOLONUM, ESTRADIOLUM, ACIDUM SALIC

Opis produktu

Opis

Skład:

1 ml płynu na skórę zawiera 2 mg prednizolonu (Prednisolonum), 0,05 mg estradiolu benzoesanu (Estradiolum) i 4 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum)

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glikol propylenowy

Postać farmaceutyczna:

Płyn na skórę

Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

Wskazania do stosowania:

Alpicort E jest wskazany do stosowania u dorosłych w wieku od 18 lat.

W przebiegu różnych postaci łysienia, zwłaszcza w łysieniu androgenozależnym.

Dawkowanie:

Stosować jeden raz na dobę, najlepiej wieczorem.

Gdy tylko objawy zapalne nieco ustąpią, wystarczy stosowanie 2 do 3 razy w tygodniu.

W tym celu nanosić produkt otworem aplikatora skierowanym do dołu, na leczone miejsca.

Następnie masować palcami skórę głowy przez 2–3 minuty.

Czas trwania leczenia małych powierzchni nie powinien, ze względu na obecność prednizolonu w roztworze, być dłuższy niż 2–3 tygodnie. Do świadczenia klinicznego obejmuje okres leczenia do 6 miesięcy. Nie prowadzono badań dotyczących czasu utrzymywania się działania po odstawieniu leku.

Dzieci i młodzież:

Alpicort E jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku do 18 lat

Sposób podawania:

Do stosowania na skórę głowy.

Przeciwwskazania:

Alpicort E jest przeciwwskazany w:

- nadwrażliwości na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
- u niemowląt, dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat,
- w przypadkach nowotworów estrogenozależnych lub w przypadku ich podejrzenia,
- w przypadku niewyjaśnionych krwawień z narządów rozrodczych,
- w okolicach błon śluzowych, w jamie ustnej, do lub w okolicach oczu oraz w okolicach genitaliów lub wewn ętrznie,
- w przypadku ospy wietrznej, szczególnych schorze ń skóry (gru żlica, kiła) i zapalnych reakcji na szczepienia,
- przy grzybicach i bakteryjnych infekcjach skórnych,
- w przypadku okołoustnych chorób zapalnych skóry (ob jawy podrażnienia skóry wokół ust z zaczerwienieniem i guzkami) i trądziku różowatego (zaczerwienienie twarzy z ewentualnymi zapalnymi lub ropnymi pryszczami),
- w wilgotnych lub ostrych schorzeniach skóry głowy.

Działania niepożądane:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: nadwrażliwość skórna

Bardzo rzadko: jak w przypadku wszystkich produktów zawieraj ących glikokortykosteroidy, może dojść do zmian skórnych (zmniejszenie grubo ści skóry, poszerzenie małych naczy ń krwionośnych, tworzenie się pasemek, trądzik sterydowy, okołoustne zapalenie skóry, nadmier ne owłosienie ciała).

Zaburzenia oka:

Nie znana: nieostre widzeni

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.