

Alpicort E płyn 100 ml

Nasza cena: 63,82 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	100 ml
Postać	PLYN
Producent	Dr August Wolff Niemcy [De]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	PREDNISOLONUM, ESTRADIOLUM, ACIDUM SALIC

Opis produktu

Opis

Lek Alpicort E to płyn na skórę, zawierający prednizolon, żeńskie hormony płciowe oraz kwas salicylowy do stosowania na skórze głowy.

Wskazania:

W przebiegu różnych postaci łysienia, zwłaszcza w łysieniu androgenozależnym

Kiedy nie stosować leku?

- jeśli pacjent ma uczulenie na prednizolon, kwas salicylowy, estradiolubenzoesan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- u niemowląt, dzieci i młodzieży poniżej 18 lat,
- w przypadkach nowotworów estrogenozależnych lub przy ich podejrzeniu,
- w przypadku niewyjaśnionych krwawień z narządów rozrodczych,
- w okolicach błon śluzowych, w jamie ustnej, do lub w okolicach oczu oraz w okolicach genitaliów lub wewnętrznie,
- w przypadku ospy wietrznej, szczególnych schorzeń skóry (gruźlica, kiła) i zapalnych reakcji na szczepienia,
- przy grzybicach i bakteryjnych infekcjach skórnych,
- w przypadku okołoustnych chorób zapalnych skóry (objawy podrażnienia skóry wokół ust z zaczerwienieniem i guzkami) i trądziku różowatego (zaczerwienienie twarzy z ewentualnymi zapalnymi lub ropnymi pryszczami),
- w wilgotnych lub ostrych schorzeniach skóry głowy.

W jaki sposób stosować lek?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek Alpicort E należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza i ze wskazówkami zawartymi w niniejszej ulotce informacyjnej. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Lek Alpicort E jest roztworem do stosowania na skórę. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, lek Alpicort E stosować 1 raz na dobę, najlepiej wieczorem. Gdy tylko objawy zapalne nieco ustąpią, wystarczy stosowanie 2 do 3 razy w tygodniu.

Podczas każdego użycia postępować w sposób następujący:

- Zdejmij zatyczkę z aplikatora
- Obróć butelkę z aplikatorem nad głową tak, żeby otwór znajdujący się na szczycie skierowany był w dół
- Nanieś lek przeciągając aplikatorem z otworem skierowanym w dół po leczonych miejscach
- Po użyciu leku Alpicort E nałóż zatyczkę na aplikator
- Następnie masuj palcami skórę głowy przez 2–3 minuty.

Czas trwania terapii:

Czas trwania leczenia małych powierzchni nie powinien, ze względu na obecność prednizolonu w roztworze, być dłuższy niż 2–3 tygodnie. Doświadczenie kliniczne obejmuje okres leczenia do 6 miesięcy. Nie prowadzono badań dotyczących czasu utrzymywania się działania po odstawieniu leku.

Skład:

Substancjami czynnymi leku są prednizolon, benzoesan estradiolu i kwas salicylowy.

Pozostałe składniki to: alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, arginina, woda oczyszczona.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.