

# Alpragen 1 mg 30 tabletek

Nasza cena: 23,40 zł

## Opis słownikowy

Dawka	1 MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	Generics (Uk) Ltd. Wielka Brytania [Gb]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	ALPRAZOLAMUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

Krótkotrwałe leczenie objawowe zespołu lęku uogólnionego. Alprazolam jest wskazany jedynie wtedy, gdy zaburzenia są znacznie nasilone, zaburzają normalne funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta. Podobnie jak w przypadku wszystkich benzodiazepin, lekarze muszą mieć świadomość, że długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do rozwinięcia zależności lekowej.

### Dawkowanie:

Dawkowanie ustalane jest indywidualnie przez lekarza na podstawie stanu zdrowia pacjenta oraz rodzaju i intensywności schorzenia.

Dorośli: zazwyczaj stosowana dawka w zespole lęku uogólnionego wynosi 0,25-0,5 mg 3x/dobę. Może być zwiększana (w razie potrzeby) w odstępach czasu co 3-4 dni do maks. dawki 4 mg/dobę. Pacjenci w podeszłym wieku lub pacjenci z wyniszczającymi chorobami: u pacjentów w podeszłym wieku klirens leku jest zmniejszony i, podobnie jak w przypadku innych benzodiazepin, zwiększa się wrażliwość na lek.

### Działanie:

Alprazolam to pochodna benzodiazepiny, wywiera zależne od dawki działanie hamujące na OUN, począwszy od niewielkiego uspokojenia, poprzez sen do śpiączki. Benzodiazepiny pobudzają oraz ułatwiają działanie hamujące kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), który jest głównym inhibitorem przewodnictwa nerwowego w mózgu i jest mediatorem hamowania pre- i postsynaptycznego we wszystkich obszarach mózgu.

### Przeciwwskazania:

Alprazolam jest przeciwwskazany u pacjentów: ze stwierdzoną nadwrażliwością na benzodiazepiny, alprazolam lub na którykolwiek ze

składników preparatu, z miastenią, ciężką niewydolnością oddechową, zespołem bezdechu sennego, ciężką niewydolnością wątroby, ostrym zatruciem alkoholem lub innymi substancjami, przyjmujących substancje działające na OUN, jaskrą z wąskim kątem przesączania.

### **Działania niepożądane:**

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (rzadko) nieprawidłowy skład krwi (dyskrazja). Zaburzenia endokrynologiczne: (niezbyt często) hiperprolaktynemia. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (często) zmniejszenie apetytu. Zaburzenia psychiczne: (często) splątanie, depresja; (niezbyt często) omamy, wybuchy złości, zachowania agresywne, wrogie zachowanie, niepokój, pobudzenie, zmiany libido, bezsenność, zaburzenia myślenia, nerwowość pobudzenie. Zaburzenia układu nerwowego: (bardzo często) sedacja, senność; (często) ataksja, zaburzenia koordynacji, zaburzeni pamięci, zaburzenia mowy, trudności w koncentracji, zawroty głowy, bóle głowy, uczucie pustki w głowie; (niezbyt często) niepamięć, dystonia, drżenie, suchość w jamie ustnej; (nieznana) objawy wegetatywne, brak łaknienia, otępienie emocjonalne, zmniejszona czujność.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.