

# Ambrosol Teva, syrop 30mg/5ml, 120 ml



Nasza cena: 14,89 zł

## Opis słownikowy

Dawka	30MG/5ML
Opakowanie	120ml
Postać	SYROP
Producent	TEVA PHAMACEUTICALS POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	AMBROXOLUM

## Opis produktu

### Opis

Ambrosol syrop zawiera jako substancję czynną ambroksol, który działa wykrztuśnie i mukolitycznie (rozrzedza śluz).

### Dawkowanie - Ambrosol Teva, syrop 30mg/5ml, 120 ml

Lek należy zażywać doustnie, po posiłku. Leku nie należy podawać bezpośrednio przed snem.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Początkowo, przez 2 do 3 dni należy stosować 30 mg ambroksolu chlorowodorku (5 ml syropu, czyli 1 łyżka miarowa) 3 razy na dobę; następnie dawkę należy zmniejszyć do 30 mg (5 ml syropu, czyli 1 łyżka miarowa) 2 razy na dobę.  
Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: 15 mg ambroksolu chlorowodorku (2,5 ml syropu, czyli 1/2 łyżki miarowej) 2 do 3 razy na dobę.  
Dzieci w wieku od 2 lat do 6 lat: 7,5 mg ambroksolu chlorowodorku (1,25 ml syropu, czyli 1/4 łyżki miarowej) 3 razy na dobę.  
Dzieci w wieku od 1 do 2 lat: 7,5 mg ambroksolu chlorowodorku (1,25 ml syropu, czyli 1/4 łyżki miarowej) 2 razy na dobę.

Nie stosować u dzieci bez porozumienia z lekarzem. Jeżeli leczenie trwa dłużej niż 7 do 14 dni, dawkę należy zmniejszyć. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek nie zawiera cukru.

### Składniki - Ambrosol Teva, syrop 30mg/5ml, 120 ml

Skład (5 ml syropu = 1 łyżka miarowa): substancja czynna: 30 mg ambroksolu chlorowodorku; substancje pomocnicze: sorbitol płynny 70% (E420), glicerol (E422), kwas cytrynowy jednowodny (E330), glikol propylenowy (E1520), metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), aromat truskawkowy, woda oczyszczona.

### Działania

Zwiększa ilość śluzu w drogach oddechowych, zmniejsza jego lepkość, przyspiesza transport wydzieliny w drogach oddechowych, co ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

### Wskazania - Ambrosol Teva, syrop 30mg/5ml, 120 ml

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, przebiegające z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny oskrzelowej, takie jak:

- ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli;
- astma oskrzelowa;
- mukowiscydoza;
- rozedma płuc;
- rozstrzenie oskrzeli.

### Przeciwwskazania - Ambrosol Teva, syrop 30mg/5ml, 120 ml

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

### Przeciwwskazania - Ambrosol Teva, syrop 30mg/5ml, 120 ml

- często: biegunka.
- niezbyt często: nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu, niestrawność, reakcje nadwrażliwości, gorączka.
- rzadko: zgaga.
- bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, ciężkie reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**