

## Amol, płyn, 100 ml



Nasza cena: 26,02 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	100 ml
Postać	PLYN
Producent	Takeda Pharma Polska [PI]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PRODUCTUM COMPOSITUM

### Opis produktu

#### Opis

### Amol, płyn, 100 ml

Lek przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

#### Dawkowanie - Amol, płyn, 100 ml

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia:

Zewnętrznie do nacierania w celu poprawy złego samopoczucia:  
 Nacierać niewielką ilością leku w formie nierozcieńczonej kilka razy dziennie.

Zewnętrznie w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów:  
 Miejsce po ukąszeniu przetrzeć wacikiem nasączonym lekiem w formie nierozcieńczonej.

Doustnie w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych):  
 Od 10 do 15 kropli leku z płynem lub z cukrem, należy przyjmować doraźnie w przypadku wystąpienia dolegliwości, do 3 razy dziennie.

Leku nie należy stosować pod opatrunkiem utrudniającym dostęp powietrza lub w postaci okładów.

#### Składniki - Amol, płyn, 100 ml

1 g leku zawiera substancje czynne:

- Mentholum (mentol) 17,23 mg
  - Citronellae aetheroleum (olejek cytronelowy) 1,00 mg
  - Caryophylli floris aetheroleum (olejek goździkowy) 1,00 mg
  - Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (olejek cynamonowy) 2,40 mg
  - Limonis aetheroleum (olejek cytrynowy) 5,70 mg
  - Menthae piperitae aetheroleum (olejek mięty pieprzowej) 2,40 mg
  - Lavandulae aetheroleum (olejek lawendowy) 2,40 mg
- oraz substancje pomocnicze: etanol 96 vol.% (638 mg), woda.

## Działania

Działanie leku wynika z działania poszczególnych substancji czynnych.

## Wskazania - Amol, płyn, 100 ml

Amol stosowany jest tradycyjnie w następujących wskazaniach:

zewnątrznie:

- w celu poprawy złego samopoczucia np. w przebiegu przeziębienia (do nacierañ),
- w bólach głowy, bólach mięśniowych,
- w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów.

wewnątrznie:

- w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych) np. wzdęcia i niestrawność.

## Przeciwwskazania - Amol, płyn, 100 ml

Leku Amol nie wolno stosować:

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku,
- w astmie oskrzelowej i innych schorzeniach dróg oddechowych, którym towarzyszy silna nadwrażliwość dróg oddechowych,
- u dzieci poniżej 12 roku życia, ze względu na brak wystarczających badań na temat stosowania leku

Amol w tej grupie wiekowej.

Wewnątrznie

- w przypadku niedrożności dróg żółciowych (np. w przebiegu kamicy żółciowej), zapalenia pęcherzyka żółciowego,
- u osób z przewlekłymi chorobami wątroby, u osób uzależnionych od alkoholu.

Zewnątrznie

- na uszkodzoną skórę np. przy oparzeniach, wypryskach i ranach otwartych, przy chorobach skóry przebiegających z wysypką, na błony śluzowe oraz w okolicach oczu.

## Przeciwwskazania - Amol, płyn, 100 ml

Jak każdy lek, Amol może powodować działania niepożądane. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z działań niepożądanych należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Działania niepożądane wynikają z działania poszczególnych olejków.

Po zastosowaniu leku tak jak w przypadku wszystkich olejków eterycznych mogą ulec nasileniu objawy podrażnienia skóry i błon śluzowych. Może pojawić się lub ulec pogorszeniu kaszel i skurcz oskrzeli. U osób wrażliwych mogą wystąpić objawy żołądkowe. Prawdopodobne jest wystąpienie wyprysku kontaktowego i/lub reakcji nadwrażliwości. W takich przypadkach należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

## Uwagi

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku Amol w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Ze względu na zawartość etanolu, lek może wywierać wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Dlatego też nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn po stosowaniu doustnym leku.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**