

Androman kapsułki, 30 sztuk



Nasza cena: 77,22 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	kapsułki
Producent	Biovena Health Sp. Z O.o. Polska [PL]
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

OPIS

Androman to suplement diety przygotowany specjalnie dla mężczyzn. Zawiera składniki wspomagające płodność u mężczyzn. Preparat przeznaczony dla dorosłych mężczyzn.

SKŁADNIKI	Składnik	2 kapsułki (%RWS*)
	L-karnityna	700 mg (-)
	Witamina C (kwas L-askorbinowy)	60 mg (75% RWS*)
	Koenzym Q10	20 mg (-)
	Witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu)	10 mg (83% RWS*)
	Cynk	10 mg (100% RWS*)
	Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy)	200 µg (100% RWS*)
	Selen	50 µg (91% RWS*)
	Witamina B12 (cyjanokobalamina)	1 µg (40% RWS*)

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Winian L-karnityny, kapsułka (żelatyna), substancja wypełniająca: celuloza; substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; kwas L-askorbinowy (witamina C); koenzym Q10; cytrynian cynku; octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); L-selenometionina; cyjanokobalamina (witamina B12); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy).

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW

Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych.

Selen przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy.

Witamina E jest silnym antyoksydantem.

Witamina B12 oraz kwas foliowy przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE

Dorośli: 2 kapsułki dziennie (jedna rano, druga wieczorem)

MASA NETTO

30 kapsułek

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 0-25°C w zamkniętym opakowaniu.

PRODUCENT / DYSTRYBUTOR

Biovena Health Sp. z o.o.

ul. Odrowąża 15

03-310 Warszawa

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.