

Angeliq 28 tabletek

Nasza cena: 34,18 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*28
Postać	Tabletki
Producent	SCHERING AG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	ESTRADIOLUM, DROSPIRENONUM

Opis produktu

Opis

Angeliq jest to lek stosowany w Hormonalnej Terapii Zastępczej w leczeniu objawów niedoboru estrogenów u kobiet będących ponad 1 rok po menopauzie.

Skład jakościowy i ilościowy:

Jedna tabletki zawiera 1 mg estradiolu w postaci półwodzianu estradiolu i 2 mg drospirenonu.

substancje pomocnicze:

Rdzeń tabletki:

- laktoza jednowodna
- skrobia kukurydziana
- skrobia kukurydziana, żelowana
- powidon
- magnezu sterynian

Otoczka:

- hypromeloza
- makrogol
- talk
- tytanu dwutlenek
- żelaza tlenek czerwony

Wskazania:

Angeliq jest stosowany w leczeniu objawów niedoboru estrogenów u kobiet, które są ponad rok po menopauzie.

Dodatkowo stosowany jest w celu zapobiegania osteoporozie u kobiet po menopauzie, które obciążone są wysokim ryzykiem przyszłych złamań. Preparat ten stosuje się kiedy istnieją przeciwwskazania do stosowania innych produktów leczniczych stosowanych do zapobiegania osteoporozie.

Dawkowanie:

Terapia zalecana jest i kontrolowana przez lekarza. Również lekarz ustala dawkowanie.

Przyjmuje się stosowania jednej tabletki na dobę. Jeden blister przeznaczony jest na 28 dniową kurację.

Przyjmowanie Angeliq:

Tabletki należy połykać w całości popijając wodą. Angeliq można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletkę zaleca się przyjmować codziennie o tej samej porze.

Przeciwwskazania:

Leku nie wolno stosować jeśli występuje przeciwwskazania do jego stosowania. Lekarz przepisujący lek przeprowadzi szczegółowy wywiad, w którym wykluczy przeciwwskazania. Pełna lista znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.