


Antidol, 15 mg, 10 tabletek



Nasza cena: 16,53 zł

Opis słownikowy

Dawka	15MG
Opakowanie	*10
Postać	Tabletki
Producent	Sandoz Gmbh Kundl
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	Psychotrop

Opis produktu

Opis

Antidol, 15 mg, 10 tabletek

ANTIDOL 15 jest szybko działającym lekiem przeciwbólowym stosowanym w zwalczaniu umiarkowanego i silnego bólu. Swoją skuteczność, ANTIDOL 15, zawdzięcza połączeniu dwóch substancji czynnych o działaniu przeciwbólowym, paracetamolu i fosforanu kodeiny

Dawkowanie

Dawkowanie - Antidol, 15 mg, 10 tabletek

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1-2 tabletki co 4-6 godzin do 4 razy na dobę (maksymalnie 8 tabletek na dobę).

Wskazania

Ból o średnim i dużym nasileniu, różnego pochodzenia: ból głowy; bóle zębów, po ekstrakcji; bólach kostno-stawowych, także pourazowych; bólach pourazowych tkanek miękkich; bólach miesiączkowych.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować w przypadku:

- nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku
- ciężkiej niewydolności wątroby i nerek
- choroby alkoholowej
- stosowania inhibitorów MAO oraz w okresie do 2 tygodni po ich odstawieniu
- we wrodzonym niedoborze dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej
- u dzieci poniżej 12 lat

Możliwe działania nieporządane

Działania niepożądane Antidol są rzadki, ale możliwe są reakcje alergiczne z wysypką skórą. Istnieje kilka doniesień o zaburzeniach w obrazie morfologicznym krwi. Kodeina może powodować czasami zaparcia.

Długotrwałe regularne przyjmowanie kodeiny może prowadzić do uzależnienia oraz objawów niepokoju, w przypadku zaprzestania stosowania leku można zaobserwować zwiększoną drażliwość.

Dłuższe stosowanie leków przeciwbólowych z powodu bólu głowy może naisłać dolegliwości.

Uwagi

O tym co powoduje ból głowy i jakie są jego przyczyny dowiedzą się Państwo z artykułu "O czym świadczy ból głowy?"

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.