

Apap Junior, 250mg, 10 saszetek

Nasza cena: 24,54 zł



Opis słownikowy

Dawka	250MG
Opakowanie	*10
Postać	Saszetki
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PARACETAMOLUM

Opis produktu

Opis

APAP Junior dla dzieci powyżej 4 roku życia to lek w formie granulatu w saszetkach o smaku truskawkowo-waniliowym. Produkt jest wskazany przy gorączce i bólach różnego pochodzenia. Dzięki doustnej formie, przyjmowanej bezpośrednio na język, bez potrzeby popijania, podawanie preparatu dzieciom jest wygodne i szybkie.

Dawkowanie - Apap Junior, 250mg, 10 saszetek

Dawkę ustala się na podstawie informacji podanych w poniższej tabeli. Dawka leku zależy od wieku i masy ciała, zwykle jednorazowa dawka wynosi 10-15 mg paracetamolu na kilogram masy ciała, do całkowitej dobowej do 60-75 mg/kg masy ciała. Odpowiedni odstęp między dawkami zależy od objawów i maksymalnej całkowitej dawki dobowej. Należy zachować co najmniej 6-godzinny odstęp pomiędzy dwiema dawkami, co oznacza podawanie leku maksymalnie 4 razy na dobę.

Masa ciała (wiek)	Pojedyncza dawka	Maksymalna dawka dobowa
17 kg - 25 kg (4-8 lat)	250 mg paracetamolu (1 saszetka)	1000 mg paracetamolu (4 saszetki)
26 kg-40 kg (8-12 lat)	500 mg paracetamolu (2 saszetki)	1500 mg paracetamolu (6 saszetek)

Lek Apap Junior podaje się wyłącznie doustnie.

Nie należy przyjmować leku po posiłku.

Granulat należy przyjąć bezpośrednio do jamy ustnej na język, a następnie połknąć bez popijania.

Składniki - Apap Junior, 250mg, 10 saszetek

1 saszетка zawiera:

substancję czynną: paracetamol 250 mg

Ponadto lek zawiera: sorbitol, talk, kopolimer metakrylanu butyl zasadowy, magnezu tlenek lekki, karmelozę sodową, sukraloza, magnezu stearynian, hypromelozę, kwas stearynowy, sodu laurylsiarczan, tytanu dwutlenek, N,2,3-trimetylo-2-(propan-2-ylo) butanamid, symetykon, aromat truskawkowy.

Działania

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.

Wskazania - Apap Junior, 250mg, 10 saszetek

Gorączka. Ból łagodny lub umiarkowany.

Przeciwwskazania - Apap Junior, 250mg, 10 saszetek

Nie przyjmować leku:

- jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek z jego składników
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby

Przeciwwskazania - Apap Junior, 250mg, 10 saszetek

Możliwe jest wystąpienie następujących rzadkich działań niepożądanych:

- niedokrwistość
- niedokrwistość niehemolityczna i choroby szpiku kostnego z zaburzoną wytwarzaniem krwinek
- małopłytkowość
- zaburzenia zewnątrzwydzielnicze trzustki, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki
- objawy alergiczne
- pokrzywka
- reakcje anafilaktyczne
- alergie na pożywienie i leki
- choroby nerek

Interakcje

Rzadko: niedokrwistość, małopłytkowość, zaburzenia czynności trzustki, stany zapalne trzustki, objawy alergiczne, pokrzywka, alergie na pożywienie i leki, choroby nerek. Lek Apap Junior nie wpływa na sprawność psychomotoryczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.