


Apetiherb, syrop 125 g



Nasza cena: 18,65 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	125g
Postać	SYROP
Producent	HERBAPOL-WROCLAW S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PRODUCTUM COMPOSITUM

Opis produktu

OPIS

Syrop Apetiherb to produkt leczniczy roślinny, tradycyjnie stosowany w braku łaknienia.

SKŁAD

100 g syropu zawiera:

Substancja czynna:

Wyciąg płynny (1:2) złożony z : ziela krwawnika (*Achillea millefolium* L. herba), ziela szanty (*Marrubium vulgare* L. herba), liścia melisy (*Melissa officinalis* L. folium), owocu kopru włoskiego (*Foeniculum vulgare* Mill. fructus) (3/2/3/2) – 15 g na 100 g produktu leczniczego, woda oczyszczona

Substancje pomocnicze:

sacharoza, woda oczyszczona, koncentrat pomarańczowy 2578 (naturalny sok z pomarańczy, woda), benzoesan sodu (E211).

Opakowanie: 125 g preparatu.

DAWKOWANIE

Dorośli – 3 do 4 razy na dobę 15 ml miarką.

Dzieci i młodzież

Dzieci od 3 lat do 6 lat – 2 razy na dobę 2,5 ml miarką.

Dzieci powyżej 6 lat i młodzież do 18 lat – 2 do 3 razy na dobę 5 ml miarką.

Przy podawaniu dzieciom dawkę syropu należy rozcieńczyć w niewielkiej ilości słabej herbaty lub wody.

Sposób stosowania

Syrop stosować doustnie, ok. pół godziny przed posiłkiem.

Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie.

Czas stosowania

Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Apetiherb

Dotychczas nie zaobserwowano objawów przedawkowania podczas stosowania leku Apetiherb.

Pominięcie zastosowania leku Apetiherb

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Apetiherb

Po przerwaniu stosowania leku może wystąpić ponowny brak łaknienia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

WSKAZANIA

Syrop Apetiherb to produkt leczniczy roślinny, tradycyjnie stosowany w braku łaknienia.

PRZECIWSKAZANIA

Nie stosować leku Apetiherb

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

jeśli pacjent ma uczulenie na rośliny z rodziny astrowate/ złożone ((Asteraceae/Compositae) np. rumianek, nagietek.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE / SKUTKI UBOCZNE

Podczas stosowania produktu leczniczego Apetiherb mogą wystąpić:

zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (alergiczne reakcje skórne) – częstość nieznana,

zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia (alergiczne reakcje ze strony układu oddechowego) – częstość nieznana.

Częstość nieznana – nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA LEKU

15 ml leku Apetiherb zawiera ok. 12 g sacharozy.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

INTERAKCJE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji produktu Apetiherb z innymi lekami.

CIĄŻA I KARMIEPIERSIĄ

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Z uwagi na brak danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży i karmienia piersią nie należy stosować produktu w tym okresie.

Wpływ na płodność nie jest znany.

STOSOWANIE U DZIECI

Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGA MASZYN

Lek Apetiherb nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

PRODUCENT / DYSTRYBUTOR**Herbapol Wrocław S.A.**

50-951 Wrocław

ul. Św. Mikołaja 65/68

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.