

Apo-Doxan 4 30 tabletek 4 mg

Nasza cena: 13,45 zł

Opis słownikowy

Dawka	4MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	APOTEX EUROPE B.V. HOLANDIA [NL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	DOXAZOSINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Produkt jest najczęściej wskazany do stosowania u pacjentów, u których występują problemy związane z przerostem gruczołu krokowego takie jak:

- uczucie nagłego parcia na mocz,
- zmniejszenie strumienia moczu,
- przerywane oddawanie moczu,
- oddawanie moczu po kropli,
- uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza moczowego,
- konieczność oddawania moczu w nocy,
- częstomocz,
- uczucie pieczenia w cewce moczowej.

Produkt może być stosowany również w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego w monoterapii.

Dawkowanie:

Dawka leku powinna być ustalona indywidualnie dla każdego pacjenta. Nie należy stosować dawki większej niż wskazana przez lekarza.

Leczenie objawów dyzurycznych wywołanych łagodnym przerostem gruczołu krokowego:

- zaleca się stosowanie dawki początkowej wynoszącej 1 mg. Dawka dobową może być zwiększona maksymalnie do 8mg na dobę.

Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego w monoterapii:

- zalecana początkowa dawka dobową powinna wynosić 1 mg, dawkę tą można zwiększyć maksymalnie do 16mg.

Wszelkie zwiększenia dawki powinny być przeprowadzane pod kontrolą lekarza prowadzącego. W celu zapoznania się ze szczegółowym sposobem podawania leku należy zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania leku.

Działanie:

Lek wykazuje silne działanie przeciwnadciśnieniowe. Nie powoduje zaburzeń metabolicznych u pacjentów ze współistniejącą cukrzycą, dną moczanową i insulinoopornością.

Skład:

1 tabletkę zawiera w swoim składzie 4 mg doksazosyny w postaci mezylanu doksazosyny.

Przeciwwskazania:

Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów u których występuje nadwrażliwość na doksazosynę, pochodne chinazoliny np. prazosin, terazosin lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku u pacjentów mogą występować działania niepożądane objawiające się takimi objawami jak:

- niepokój,
- bezsenność,
- nerwowość,
- bóle głowy,
- zawroty głowy,
- parestezje,
- senność,
- apatia,
- zaburzenia akomodacji,
- kołatanie serca,
- tachykardia,
- ból w klatce piersiowej,
- hipotonia ortostatyczna,
- obrzęki,

- duszność,
- zatkany nos,
- bóle brzucha,
- biegunka,
- niestrawność,
- suchość w ustach,
- nudności,
- zaparcia,

W celu zapoznania się z innymi działaniami niepożądanymi należy zasięgnąć informacji lekarza prowadzącego lub też zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.