

# Apo-Napro 250 mg 30 tabletek

Nasza cena: 6,81 zł

## Opis słownikowy

Dawka	250MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	APOTEX EUROPE B.V. HOLANDIA [NL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	NAPROXENUM

## Opis produktu

### Opis

## Wskazania - Apo-Napro 250 mg 30 tabletek

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów, ostrych zaburzeń mięśniowo-szkieletowych, bolesnego miesiączkowania oraz ostrej dny moczanowej, a także objawowe leczenie gorączki.

## Dawkowanie - Apo-Napro 250 mg 30 tabletek

Lek do stosowania doustnego. Należy go stosować ściśle według zaleceń lekarza, który indywidualnie ustala dawkę i częstotliwość podawania. W celu zagwarantowania skuteczności i bezpieczeństwa w leczeniu należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z właściwościami leku opisanymi w ulotce. Nie należy zażywać leku po upływie terminu ważności.

## Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

## Skład

1 tabletkę zawiera 250 mg naproksenu.

## Przeciwwskazania - Apo-Napro 250 mg 30 tabletek

Nadwrażliwość na naproksen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka, krwotok z żołądka lub dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego. Reakcje alergiczne na naproksen np. astma, zapalenie błony śluzowej

nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka. Ciężka niewydolność serca, niewydolność wątroby i niewydolność nerek, a także III trymestr ciąży.

## Działania niepożądane

U pacjentów stosujących lek mogą wystąpić wrzody, perforacje i krwawienie z żołądka lub dwunastnicy (czasami również śmiertelne, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku), nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, bóle brzucha, smołowate stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zapalenie okrężnicy i choroby Cohna. Zapalenie błony śluzowej żołądka i trzustki, nieprawidłowa czynność wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka. Reakcje alergiczne i anafilaktyczne, astma, skurcz oskrzeli i duszność, wysypka skórna, świąd, pokrzywka, zakrzepica tętnic (np. zawał serca lub udar), nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca. Rzadziej mogą wystąpić zaburzenia pracy nerek i dróg moczowych, krwimocz, zaburzenia widzenia, bóle głowy, zmęczenie, senność, drgawki, bezsenność, niezdolność do koncentracji i zaburzenia funkcji poznawczych, reakcje nadwrażliwości na światło.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.