

Apo-Napro 500 mg 30 tabletek

Nasza cena: 13,06 zł

Opis słownikowy

Dawka	500MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	APOTEX EUROPE B.V. HOLANDIA [NL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	NAPROXENUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Produkt jest zalecany przez lekarzy do stosowania w celu:

- leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i innych chorób reumatycznych
- leczenie ostrych zaburzeń mięśniowo-szkieletowych,
- łagodzenia objawów bolesnego miesiączkowania
- łagodzenia objawów ostrej dny moczanowej.
- leczenia objawowego gorączki różnego pochodzenia.

Dawkowanie:

Produkt powinien być stosowany pod ścisłą kontrolą lekarza i według jego zaleceń. Dawka leku zazwyczaj ustalana jest indywidualnie dla każdego pacjenta. Zazwyczaj stosuje się następujące dawki:

W chorobach reumatycznych:

Od 500 mg do 1 g w 2 dawkach podzielonych, w odstępach 12 godzin. Dopuszczalne jest przyjęcie całej dawki jednorazowo.

W ostrych zaburzeniach mięśniowo-szkieletowych i bolesnym miesiączkowaniu:

Dawkowanie należy rozpocząć od 500 mg jednorazowo, następnie 250 mg co 6-8 godzin, zależnie od potrzeb. Maksymalna dawka dobową wynosi 1250 mg.

W gorączce różnego pochodzenia:

Leczenie należy rozpocząć od 250 mg co 8 godzin, w zależności od potrzeb. Czas trwania leczenia maksymalnie powinien wynosić 5 dni.

W ostrej dnie moczanowej:

Dawka początkowa wynosi 750 mg, następnie 250 mg co 8 h do ustąpienia napadu.

Produkt nie może być stosowany przez dzieci poniżej 5 roku życia. W innych przypadkach stosowanie leku u dzieci należy skonsultować z lekarzem.

Działanie:

- przeciwbólowe
- przeciwgorączkowe.

Skład:

1 tabletkę zawiera 500 mg naproksenu.

Przeciwwskazania:

Lek nie powinien być stosowany przez pacjentów u których występują dolegliwości takie jak:

- nadwrażliwość na naproksen, naproksen sodowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- czynna lub nawracająca, choroba wrzodowa lub krwotok z żołądka i/lub dwunastnicy,
- krwawienie z przewodu pokarmowego w wywiadzie lub perforacja związane z leczeniem NLPZ,
- ciężka niewydolność serca, niewydolność wątroby i niewydolność nerek.
- III trymestr ciąży.

Działania niepożądane:

- wrzody trawienne,
- perforacje i krwawienie z żołądka i/lub dwunastnicy,
- nudności,
- wymioty,
- biegunki,
- wzdęcia,
- zaparcia,
- niestrawności,

- ból brzucha.

Powyżej została przedstawiona jedynie część działań niepożądanych jakie mogą występować podczas stosowania leku. Więcej informacji na ten temat zostało zawartych w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania leku. Informację można również uzyskać u lekarza prowadzącego lub też farmaceuty.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.