

Arnigel, żel, tuba laminowana, 45g

Nasza cena: 19,45 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	45 G (TUB. LAMINOWANA)
Postać	ZEL
Producent	BOIRON FRANCJA [FR]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	HOMEOPATHIC MEDICINALIS PRODUCT

Opis produktu

OPIS

Opis

Arnigel to produkt leczniczy homeopatyczny do miejscowego leczenia siniaków, stłuczeń i bólów mięśni po wysiłku fizycznym.

Skład

Substancja czynna: Arnica montana TM

100 g żelu zawiera 7 g Arnica montana TM

Substancje pomocnicze: karbomer, sodu wodorotlenek 10%, etanol 96% v/v, woda oczyszczona.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 1 roku życia: stosować od 1 do 3 razy na dobę.

Instrukcja użytkowania tuby z aplikatorem kulkowym typu roll-on: Wstrząsnąć a następnie delikatnie ścisnąć tubkę. Nanieść cienką warstwę żelu na bolesne miejsce delikatnie masując.

Wskazania

Arnigel jest przeznaczony do leczenia miejscowego następstw niewielkich urazów (siniaki, stłuczenia). Polecany również w bólach mięśni pojawiających się po intensywnym wysiłku fizycznym.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Arnigel w przypadku: uczulenia a Arnica montana lub na jeden ze składników podłoża, na błony śluzowe w obrębie twarzy, oczy, duże powierzchnie skóry oraz na rany.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W związku z zawartością alkoholu, częste stosowanie leku może powodować podrażnienia i miejscowe wysuszenie skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W momencie ustąpienia objawów należy przerwać stosowanie leku.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Arnigel może wchodzić w interakcję z: preparatami przeciwzakrzepowymi z grupy antagonistów witaminy K.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku u kobiet w ciąży lub karmiących piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Ze względu na zawartość etanolu nie stosować u dzieci poniżej pierwszego roku życia bez konsultacji z lekarzem.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.