

Artelac, 3,2 mg/ml, krople, 10 ml (import równoległy)



Nasza cena: 20,83 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	10ml
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	HYDROXYPROPYLMETHYLCELLULOSUM

Opis produktu

Opis

Preparat z grupy sztucznych łez

Dawkowanie - Artelac, 3,2 mg/ml, krople, 10 ml (import równoległy)

Zwykle 1 kropla do worka spojówkowego 3-5 razy na dobę lub częściej w zależności od potrzeb. Preparat można stosować do zwilżania twardych soczewek kontaktowych, w większości przypadków, przez czas nieograniczony. Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek do oczu, to każdy z tych leków należy podawać z zachowaniem co najmniej 15-minutowej przerwy; preparat Artelac należy podawać jako ostatni po upływie 15 min. od podania poprzedniego leku.

Składniki - Artelac, 3,2 mg/ml, krople, 10 ml (import równoległy)

1 ml roztworu zawiera 3,2 mg hypromelozy.

Działania

Zawarta w preparacie hypromeloza dobrze przylega do powierzchni spojówek i rogówki oka, dzięki czemu zapewnia odpowiednie nawilżenie powierzchni gałki ocznej, zapobiega podrażnieniu oka wywołanego mruganiem i wysuszeniem nabłonka.

Wskazania - Artelac, 3,2 mg/ml, krople, 10 ml (import równoległy)

Leczenie objawowe zespołu suchego oka. Preparat może być używany do nawilżania twardych soczewek kontaktowych.

Przeciwwskazania - Artelac, 3,2 mg/ml, krople, 10 ml (import równoległy)

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Przeciwwskazania - Artelac, 3,2 mg/ml, krople, 10 ml (import równoległy)

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości i przemijające zaburzenia widzenia. Preparat zawiera cetrymid - substancję konserwującą, która może powodować podrażnienie oka (pieczenie, zaczerwienienie, uczucie obecności ciała obcego), przy długotrwałym stosowaniu może uszkadzać nabłonek rogówki.

Uwagi

Zachować ostrożność przy długotrwałym stosowaniu. Do długotrwałego leczenia przewlekłego suchego zapalenia rogówki i spojówek zaleca się preparaty nie zawierające środków konserwujących. Preparat zachowuje trwałość przez 6 tygodni od pierwszego otwarcia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.