

Artelac, 3,2 mg/ml, krople, 10 ml



Nasza cena: 23,17 zł

Opis słownikowy

Dawka	3,2 MG/ML
Opakowanie	10 ml
Postać	KROPLE
Producent	DR MANN PHARMA NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	HYDROXYPROPYLMETHYLCELLULOSUM

Opis produktu

Opis

Artelac, 3,2 mg/ml, krople, 10 ml

Preparat z grupy sztucznych łez o dużej lepkości (7-13 mPas).

Dawkowanie - Artelac, 3,2 mg/ml, krople, 10 ml

Zwykle 1 kropla do worka spojówkowego 3-5 razy na dobę lub częściej w zależności od potrzeb. Preparat można stosować do zwilżania twardych soczewek kontaktowych, w większości przypadków, przez czas nieograniczony. Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek do oczu, to każdy z tych leków należy podawać z zachowaniem co najmniej 15-minutowej przerwy; preparat Artelac należy podawać jako ostatni po upływie 15 min. od podania poprzedniego leku.

Więcej o kroplach do oczu znajdą Państwo w artykule " Krople do oczu – jakie mają działanie i w jaki sposób je stosować".

Składniki - Artelac, 3,2 mg/ml, krople, 10 ml

1 ml roztworu zawiera 3,2 mg hypromelozy.

Działania

Zawarta w preparacie hypromeloza dobrze przylega do powierzchni spojówek i rogówki oka, dzięki czemu zapewnia odpowiednie nawilżenie powierzchni gałki ocznej, zapobiega podrażnieniu oka wywołanego mruganiem i wysuszeniem nabłonka.

Wskazania - Artelac, 3,2 mg/ml, krople, 10 ml

Leczenie objawowe zespołu suchego oka. Preparat może być używany do nawilżania twardych soczewek kontaktowych.

Przeciwwskazania - Artelac, 3,2 mg/ml, krople, 10 ml

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Przeciwwskazania - Artelac, 3,2 mg/ml, krople, 10 ml

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości i przemijające zaburzenia widzenia. Preparat zawiera cetrymid - substancję konserwującą, która może powodować podrażnienie oka (pieczenie, zaczerwienienie, uczucie obecności ciała obcego), przy długotrwałym stosowaniu może uszkadzać nabłonek rogówki.

Uwagi

Zachować ostrożność przy długotrwałym stosowaniu. Do długotrwałego leczenia przewlekłego suchego zapalenia rogówki i spojówek zaleca się preparaty nie zawierające środków konserwujących.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.