

# Asamax 500 100 tabletek 500 mg

Nasza cena: 7,61 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,5 G
Opakowanie	*100
Postać	TABL.DOJELIT.
Producent	ASTELLAS PHARMA SP.Z.O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	MESALAZINUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

#### Produkt jest wskazany do stosowania przy leczeniu:

- Wrzodziejącego zapalenia jelita grubego o przebiegu łagodnym do umiarkowanego, zarówno w fazie ostrej, jak i w fazie remisji choroby,
- W chorobie Crohna w obrębie okrężnicy, zarówno w fazie ostrej, jak i w fazie remisji choroby.

### Dawkowanie:

Produkt może być stosowany zarówno przez osoby dorosłe jak i dzieci powyżej 6 roku życia. Tabletki przyjmuje się w różnych dawkach w zależności od tego w jak zaawansowanej fazie jest choroba.

#### Wrzodziejące zapalenie jelita grubego:

- w fazie ostrych objawów: od 2 do 4,5 g na dobę w 3 lub 4 podzielonych dawkach,
- w fazie remisji, w celu zapobiegania nawrotom choroby: co najmniej 2 g nadobę, w dawkach podzielonych.

#### Choroba Crohna:

- w fazie ostrych objawów: maksymalnie 4,5 g na dobę w 3 lub 4 podzielonych dawkach,
- w fazie remisji, w celu zapobiegania nawrotom choroby: maks. 3 g na dobę w 3 lub 4 podzielonych dawkach,

Dzieci i młodzież. Istnieją ograniczone dane na temat stosowania mesalazyny u dzieci (wiek 6-18 lat)

Preparat może być stosowany u dzieci powyżej 6 roku życia z zachowaniem szczególnej ostrożności. Podobnie jak u dorosłych dawka leku zależy od fazy w jakiej znajduje się pacjent.

- w fazie ostrych objawów: dawkowanie ustala się indywidualnie zaczynając od dawek 30-50 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka wynosi 75 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. Całkowita dawka nie powinna być większa niż 4 g na dobę.

- w fazie remisji: dawkowanie należy ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta, zaczynając od dawek 15 bądź 30 mg na każdy kilogram masy ciała w ciągu doby w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka nie powinna przekraczać: 75 mg na kilogram masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. Całkowita dawka nie powinna być większa niż 2 g na dobę.

Dzieciom o masie ciała do 40 kg zaleca się podawanie połowy dawki przeznaczonej dla dorosłych a dzieciom o masie ciała większej niż 40 kg, dawkę taką jak u dorosłych. Pożądane działanie terapeutyczne leczenia mesalazyną może być osiągnięte jedynie wówczas, gdy zalecenia dawkowania są konsekwentnie i dokładnie przestrzegane.

## Działanie:

Badania prowadzone nad mechanizmem działania salazosulfapirydyny, leku stosowanego we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego i chorobie Crohna wykazały, że substancja czynna jest rozdzielana w okrężnicy na 2 metabolity: kwas 5-aminosalicylowy (mesalazyna) i sulfapirydynę. Prawdopodobnie mesalazyna wywiera bezpośrednie działanie przeciwzapalne na zmiany patologiczne w tkance śródmiąższowej jelita, tak więc regularne przyjmowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza może zatrzymać rozwój procesu chorobowego. Mesalazyna jest uwalniana w końcowym odcinku jelita cienkiego i początkowym odcinku jelita grubego.

## Skład:

1 tabletkę dojelitową zawiera 500 mg mesalazyny.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku jeżeli stwierdzono u pacjenta nadwrażliwość na salicylany lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby.

## Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku Asamax mogą występować działania niepożądane przejawiające się między innymi poprzez:

- zmieniona liczba krwinek,
- reakcje nadwrażliwości takie jak wyprysk alergiczny,
- gorączka polekowa,
- toczeń rumieniowaty, pancolitis,
- ból głowy,
- zawroty głowy,
- zapalenie mięśnia sercowego,
- zapalenie osierdzia,
- ból brzucha,
- biegunka,

- wzdęcia,
- nudności,
- wymioty,
- zaburzenia wątroby i dróg żółciowych,
- zapalenie wątroby,
- ból mięśni,
- ból stawów,
- zaburzenia nerek i dróg moczowych.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.